

Tabla 1		
Número de participantes por tipo de escuela, grado y género.		
	Masculino	Femenino
	N	N
Total	1618	2032
Tipo de escuela		
Urbano Pública	966	1231
Urbano Privada	379	465
Urbano Marginal	74	101
Rural	199	235
Grado		
Grado 6	424	485
Grado 7	511	657
Grado 8	324	415
Grado 9	344	451
Edad		
11 años o menor	161	222
12 años	346	420
13 años	365	534
14 años	368	440
15 años	239	263
16 años	86	111
17 años o mayor	41	32

Tabla 2
Prevalencia de uso de tabaco entre estudiantes venezolanos.
EMTAJOVEN Venezuela 1999

	Nunca ha fumado cigarrillos	Fumador actual de cigarrillos (1)	Fumador frecuente (2)	Consumidores de otro producto de tabaco además de cigarrillo en los últimos 30 días. (3)	Consumidores regulares de cualquier producto de tabaco. (4)	Consumidores regulares de Chimó (5)
	%	%	%	%	%	%
Total	20.2	6.8	0.6	8.9	14.2	5.9
Masculino	22.6	6.1	0.4	10.8	15.4	7.8
Femenino	18.0	7.0	0.6	6.4	12.3	3.5
Grado 6	12.6	4.0	0.0	6.9	9.8	6.9
Grado 7	14.5	5.1	0.1	7.9	12.0	5.5
Grado 8	24.7	8.1	0.7	9.4	15.5	4.9
Grado 9	35.8	12.4	0.8	10.4	21.4	5.3
Rural	12.0	3.7	0.4	9.5	11.9	5.0
Urbana marginal	12.8	6.0	1.7	7.9	11.2	5.3
Urbana privada	28.7	8.7	0.4	9.0	16.7	4.2
Urbana pública	19.3	6.8	0.3	8.8	14.1	6.7

- 1- Prevalencia de estudiantes que fuman 1 o más días en los pasados 30 días.
- 2- Prevalencia de fumadores actuales que fumaron en más de 20 días en los últimos 30 días.
- 3- Prevalencia de consumidores de tabaco, además de cigarrillos, in los últimos 30 días.
- 4- Prevalencia de consumidores de cualquier producto, de tabaco en los últimos 30 días.
- 5- Prevalencia de consumidores de chimó (una pasta basada en tabaco) en los últimos 30 días.

Tabla 3
Prevalencia de actividades relacionadas con el acceso a productos del tabaco entre estudiantes Venezolanos
EMTAJOVEN Venezuela 1999

	Compra de cigarrillos en almacenes, tiendas o vendedores callejeros (1)	Compra de cigarrillos sin ninguna restricción (2)	Preferencia de marcas (3)	Compra de cigarrillos detallados (4)	Compra de chimó en almacenes, tiendas o vendedores callejeros (5)	Regalo de muestras gratis a aquellos que nunca han fumado (6).	Regalo de muestras gratis a fumadores (7).
	%	%	%	%	%	%	%
Total	45.3	76.4	50.1	50.3	45	8.6	15.6
Masculino	56.3	74.6	55.6	50.1	40	9.1	19.3
Femenino	39.9	79.0	48.2	51.1	56	7.7	14.3
Grado 6	26.5	68.0	56.2	45.6	50	6.1	24.1
Grado 7	40.4	72.7	43.7	42.6	54	8.4	5.2
Grado 8	49.1	84.9	45.9	53.8	36	9.5	15.9
Grado 9	56.3	89.5	54.2	68.4	33	11.7	16.3
Rural	31.8	77.5	47.0	51.0	30	6.6	21.8
Urbana Marginal	57.3	59.3	29.4	39.7	50	9.2	13.0
Urbana Privada	47.9	84.4	66.2	57.4	42	11.1	15.5
Urbana Pública	44.7	74.7	44.1	48.6	48	8.1	15.1

- 1- Prevalencia de fumadores que compraron cigarrillos en almacenes, tiendas o vendedores callejeros en los últimos 30 días.
- 2- Prevalencia de fumadores a quienes no se les negó la venta de cigarrillos debido a su edad en los últimos 30 días.
- 3- Prevalencia de fumadores que compraron la marca líder en los últimos 30 días.
- 4- Prevalencia de estudiantes que indicaron que es posible comprar cigarrillos al detal en su área.
- 5- Prevalencia de consumidores de chimó que lo compraron en almacenes, tiendas o vendedores callejeros en los últimos 30 días.
- 6- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado a quienes un representante de ventas les ha ofrecido muestras gratis.
- 7- Prevalencia de fumadores a quienes un representante de ventas les ha ofrecido muestras gratis .

Tabla 4
 Preferencia de lugares para fumar entre estudiantes Venezolanos.
 EMTAJOVEN Venezuela 1999

	Hogar (1)	Escuela (2)	Hogares de amigos (3)	Eventos sociales (4)	Sitios Públicos (5)
	%	%	%	%	%
Total	27.7	8.0	26.3	5.7	17.5
Masculino	20.9	3.2	25.2	4.0	27.1
Femenino	32.2	10.8	26.4	6.7	12.0
Grado 6	43.3	4.9	21.3	0.0	7.4
Grado 7	26.6	11.5	21.4	1.3	23.9
Grado 8	20.5	1.7	38.3	10.2	19.6
Grado 9	26.5	11.3	20.9	8.6	18.5
Rural	35.4	17.0	19.8	5.5	10.2
Urbana marginal	20.6	0.0	38.2	3.8	24.4
Urbana privada	24.6	4.4	29.8	10.0	13.0
Urbana pública	29.1	9.7	24.0	3.7	20.1

- 1- Prevalencia de fumadores quienes usualmente fuman en su hogar.
- 2- Prevalencia de fumadores quienes usualmente fuman en la escuela.
- 3- Prevalencia de fumadores quienes usualmente fuman en hogares de sus amigos.
- 4- Prevalencia de fumadores quienes usualmente fuman en eventos sociales.
- 5- Prevalencia de fumadores quienes usualmente fuman en lugares públicos como parques, centros comerciales o esquinas de las calles.

Tabla 5
Prevalencia de actitudes concernientes a la adicción y cesación al tabaco entre estudiantes venezolanos quienes son fumadores activos. EMTAJOVEN
Venezuela 1999

	Magnitud de la adicción al tabaco (1)	Fumará dentro de 5 años (2)	Piensa que fumar es nocivo para la salud (3)	Podría dejarlo si quisiera (5)	Dejar de fumar es difícil (6)	Trató de dejar de fumar el año pasado (7)
	%	%	%	%	%	%
Total	6.6	6.1	74.7	91.2	31.1	69.4
Masculino	8.2	8.1	70.9	89.5	31.6	63.6
Femenino	4.3	5.1	78.8	95.4	30.5	73.4
Grado 6	0.0	0.0	61.2	92.7	32.1	89.6
Grado 7	5.9	4.4	74.4	94.0	26.0	58.9
Grado 8	5.1	10.4	81.4	88.8	27.9	74.5
Grado 9	5.6	4.7	76.7	90.6	35.9	65.9
Rural	10.5	8.3	56.8	85.2	37.3	81.0
Urbana marginal	0.0	16.5	87.0	100	29.4	81.3
Urbana privada	6.8	6.6	77.1	94.8	36.1	69.7
Urbana pública	6.6	4.7	74.7	89.2	28.1	66.6

- 1- Prevalencia de fumadores regulares que suelen fumar o sienten que fuman como primera cosa que hacen en la mañana
- 2- Prevalencia de fumadores regulares que piensan que definitivamente estarán fumando en los próximos de cinco años.
- 3- Prevalencia de fumadores regulares quienes definitivamente piensan que fumar es dañino para su salud.
- 4-Prevalencia de fumadores regulares quienes dicen que podrían dejar de fumar si así lo quisieran.
- 5- Prevalencia de fumadores regulares quienes piensan que definitivamente es difícil de dejar de fumar una vez que se comienza.
- 6- Prevalencia de fumadores regulares quienes intentaron dejar de hacerlo durante el año pasado.

Tabla 6
Prevalencia de conocimiento y actitudes sobre los efectos del tabaco en la salud entre estudiantes Venezolanos.
EMTAJOVEN Venezuela 1999

	Fumador regular: El tabaco es dañino (1)	Nunca ha fumado: El tabaco es dañino (2)	Fumador regular: Fumar durante 1 ó 2 años está bien (3)	Nunca ha fumado: Fumar durante 1 ó 2 años está bien (4)	Fumador regular: Fumar hace perder peso (5).	Nunca ha fumado: Fumar hace perder peso (6).	Fumador regular: El humo de otras personas es dañino (7)	Nunca ha fumado: El humo de otras personas es dañino (8)
	%	%	%	%	%	%	%	%
Total	74.7	82.4	46.2	55.6	64.3	73.2	56.6	64.3
Masculino	70.9	81.9	46.1	55.8	62.7	72.3	57.8	65.2
Femenino	78.8	83.1	47.2	56.2	65.2	74.3	55.4	63.9
Grado 6	61.2	74.0	49.1	56.1	67.4	75.3	57.2	60.7
Grado 7	74.4	83.2	47.0	54.1	70.5	75.8	59.9	63.8
Grado 8	81.4	88.6	45.3	60.8	63.7	70.8	47.0	69.4
Grado 9	76.7	91.5	42.3	52.4	61.8	67.4	63.2	66.6
Rural	56.8	83.3	24.3	59.1	93.2	78.8	28.1	64.0
Urbana marginal	87.0	70.5	74.4	48.6	63.7	78.5	24.7	47.8
Urbana privada	77.1	92.5	42.7	56.3	64.8	61.2	65.3	69.1
Urbana pública	74.7	79.8	48.1	55.2	60.6	75.6	58.3	64.3

- 1- Prevalencia de fumadores regulares quienes definitivamente piensan que fumar es nocivo para su salud.
- 2- Prevalencia de estudiantes quienes nunca han fumado quienes definitivamente piensan que fumar es nocivo para su salud.
- 3- Prevalencia de fumadores regulares quienes definitivamente piensan que fumar durante 1 ó 2 años está bien siempre que se deje después de ese tiempo
- 4- Prevalencia de estudiantes quienes nunca han fumado que definitivamente piensan que fumar durante 1 ó 2 años está bien siempre que se deje después de ese tiempo.
- 5- Prevalencia de fumadores regulares quienes definitivamente piensan que fumar hace perder peso.
- 6- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado quienes definitivamente piensan que fumar hace perder peso.
- 7- Prevalencia de fumadores regulares quienes definitivamente piensan que el humo de otras personas es dañino.
- 8- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado quienes definitivamente piensan que el humo de otras personas es dañino.

Tabla 7
Prevalencia de elementos relacionados a medios de comunicación y publicidad sobre tabaco entre estudiantes venezolanos.
EMTAJOVEN Venezuela 1999

	No han visto publicidad anti cigarrillo en los últimos 30 días. (1)	Nunca ha visto un actor fumando en los medios (2)	Estudiantes que nunca han fumado con alguna prenda con un logo de tabaco. (3)	Fumadores regulares con alguna prenda con un logo de tabaco. (4)	Estudiantes que nunca han fumado quienes nunca han visto publicidad de cigarrillo en prensa o revistas en los últimos 30 días (5)	Fumadores regulares quienes nunca han visto publicidad de cigarrillo en prensa o revistas en los últimos 30 días (6)	Estudiantes que nunca han fumado y que no han visto publicidad de cigarrillo en eventos deportivos. (7)	Fumadores regulares que no han visto publicidad de cigarrillo en eventos deportivos (8)
	%	%	%	%	%	%	%	%
Total	20.2	5.1	12.3	30.3	22.1	14.4	26.6	15.6
Masculino	21.8	5.3	14.9	35.8	23.5	14.4	26.6	19.3
Femenino	18.9	4.9	10.1	27.7	20.8	13.4	26.5	14.3
Grado 6	21.7	10.2	10.6	13.5	28.2	8.5	27.5	24.1
Grado 7	18.9	4.9	12.5	40.7	21.8	17.8	31.1	5.2
Grado 8	18.6	2.2	10.8	31.4	18.7	16.9	24.3	15.9
Grado 9	21.6	1.4	15.9	31.4	13.6	12.5	18.8	16.3
Rural	16.5	5.4	9.7	38.9	27.4	5.3	22.1	21.8
Urbana marginal	23.7	7.0	12.8	16.9	29.7	13.0	36.3	13.0
Urbana privada	22.7	1.5	15.8	30.7	16.1	16.5	22.5	15.5
Urbana pública	19.6	6.4	11.6	29.8	22.2	14.5	28.3	15.1

- 1- Prevalencia de estudiantes quienes no han visto publicidad anti tabaco en los últimos 30 días.
- 2- Prevalencia de estudiantes quienes no han visto a un actor fumar en videos o películas.
- 3- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado y que tienen alguna prenda con el logo de una marca de cigarrillo.
- 4- Prevalencia de fumadores regulares que tienen alguna prenda con el logo de una marca de cigarrillo.
- 5- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado y que no han visto publicidad sobre tabaco en periódicos y revistas en los últimos 30 días.
- 6- Prevalencia de fumadores regulares quienes no han visto publicidad sobre tabaco en periódicos y revistas en los últimos 30 días.
- 7- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado y que nunca han visto propaganda de cigarrillo en eventos deportivos, ferias, etc.
- 8- Prevalencia de fumadores regulares que nunca han visto propaganda de cigarrillo en eventos deportivos, ferias, en los últimos 30 días.

Tabla 8
Prevalencia de aspectos relacionados a la influencia social(familia, amistades, pareja) y uso de tabaco entre estudiantes Venezolanos.
EMTAJOVEN Venezuela 1999

	Nunca han fumado cuyos padres no fuman. (1)	Fumadores cuyos padres no fuman (2)	Nunca han fumado y que aceptarían un cigarro si se los ofrece un amigo. (3)	Fumadores que aceptarían un cigarro si se los ofrece un amigo (4)	Nunca han fumado cuyo mejor amigo fuma (5)	Fumadores cuyo mejor amigo fuma (6)
	%	%	%	%	%	%
Total	57.2	39.0	0.1	16.9	0.7	8.0
Masculino	57.4	49.0	0.0	14.1	0.8	6.4
Femenino	56.7	32.9	0.0	19.9	0.7	8.8
Grado 6	57.6	41.4	0.0	4.4	0.8	0.0
Grado 7	56.9	31.1	0.1	24.1	0.4	21.4
Grado 8	58.1	30.6	0.0	17.7	0.7	4.8
Grado 9	54.6	51.4	0.0	17.9	1.5	3.6
Rural	55.9	30.2	0.0	12.8	0.2	6.0
Urbana marginal	51.3	25.9	0.0	11.8	0.0	11.8
Urbana privada	60.1	46.8	0.1	20.8	0.8	0.0
Urbana pública	57.1	37.3	0.1	15.9	0.9	11.9

- 1- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado cuyos padres no fuman.
- 2- Prevalencia de fumadores cuyos padres no fuman.
- 3- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado y que lo harían si su mejor amigo se los ofrece.
- 4- Prevalencia de fumadores que aceptarían fumar un cigarrillo si su mejor amigo se los ofrece,
- 5- Prevalencia de estudiantes que nunca han fumado y que dicen que todos sus amigos cercanos fuman.
- 6- Prevalencia de fumadores regulares que dicen que todos sus amigos cercanos fuman.