

COMENTARIOS

El estudio GYTS-Perú se desarrolló en cuatro ciudades del Perú: Lima, la ciudad capital que posee una población cercana a los 7 millones de habitantes, y que alberga a la tercera parte de la población del país; Trujillo, la segunda ciudad en importancia del país, ubicada en la región de la costa del pacífico. La ciudad de Huancayo se encuentra ubicada a 2300 msnm, en la cadena montañosa andina. La ciudad de Tarapoto está ubicada en la zona amazónica selvática.

En este estudio se han definido las características de prevalencia de tabaco en la población escolar de las cuatro ciudades. La prevalencia de vida en Lima fue mayor que en las otras ciudades del interior del país. El consumo fue mayor en hombres que en mujeres, aun cuando en la ciudad capital, el consumo en las mujeres tiende a acercarse rápidamente al patrón de los varones, en forma similar a los países mas desarrollados. Cerca de la mitad de escolares entrevistados habían fumado alguna vez en la vida a la edad de 15 años. Es mas frecuente que en la ciudad de Trujillo, los varones fumen antes de los 10 años, con respecto a las mujeres.

Los estudiantes fuman principalmente en eventos sociales, con amigos o en cualquier otro lugar. Las mujeres tienden a fumar mas en la casa que los varones en algunas ciudades peruanas. Es poco frecuente que los estudiantes fumen en el colegio. La venta en tiendas y la venta callejera ambulatoria al menudeo constituyen los principales modelos de comercialización minorista. La mitad de los estudiantes adquieren los cigarrillos en las tiendas. En Tarapoto, la mitad de los estudiantes que adquirieron cigarrillos en una tienda no fueron rechazados debido a su edad. Esta situación se observó en dos de cada 10 estudiantes en las ciudades de Huancayo, Lima y Trujillo, y no fueron rechazados debido a su edad.

Una alta proporción de estudiantes que han fumado (mayor del 65%), desea dejar de hacerlo. Siete de cada diez han intentado hacerlo. Esta necesidad y búsqueda de cesación se ve frecuentemente frustrada por la falta de apoyo institucionalizado, y porque una alta proporción de jóvenes estudiantes (9 de cada 10) considera que puede dejar de fumar si lo deseara.

Aun cuando 2 a 3 de cada 10 fumadores habituales considera que fumar es dañino para la salud, un tercio de los fumadores y casi la mitad de los no fumadores en las cuatro ciudades consideraron que “es seguro fumar por solo 1 o 2 años siempre y cuando se retiren después”:

Existe una marcada campaña publicitaria de las compañías tabacaleras que impacta en los jóvenes y en particular en los estudiantes de nivel secundario en el Perú. La mitad de los estudiantes vieron mensajes antitabaco en medios de comunicación. Dos de cada diez vieron muchos avisos antitabaco en eventos deportivos, conciertos y otros eventos, o en carteleras y vallas para anuncios. Los efectos de tabaco son discutidos en las escuelas, aunque en un nivel aun insuficiente.

La exposición al humo de tabaco medioambiental es alta en las cuatro ciudades peruanas estudiadas. Dos de cada diez son expuestos dentro del domicilio, y de 3 a 4 de cada diez estudiantes fueron expuestos fuera del hogar. De cinco (Huancayo) a seis (Lima, Tarapoto y Trujillo) de cada diez estudiantes entrevistados consideran que el humo del cigarrillo que fuman otras personas les hace daño. Nueve de cada diez estudiantes están de acuerdo con que se prohíba

fumar en lugares públicos. El Perú cuenta con disposiciones legales que prohíben fumar en lugares públicos, sin embargo es necesaria mayor implementación para lograr que la población cumpla la ley, o haga respetar sus derechos a tener un ambiente libre de humo de tabaco.

REFERENCIAS

Castro de la Mata, R. Y Rojas A., M. Los jóvenes en el Perú: opiniones, actitudes y valores - 1997 (Encuesta de hogares). Monografía de Investigación 16. CEDRO. Lima, CEDRO. 254 pp. 1998

CEDRO. Drogas en el Perú Urbano Tercer Estudio Epidemiológico sobre Drogas: Principales Resultados. Lima, CEDRO, 12 pp. 1993

CEDRO. El Problema de las Drogas en el Perú. Lima, CEDRO, 136 pp. 2000

CEDRO. Tercera Encuesta de Opinión Pública sobre Drogas: Principales Resultados. Lima, CEDRO, 10 pp. 1993

Chaparro, H. Perfil de la juventud. Informe Gerencial de Marketing. Lima, APOYO Opinión y Mercado. 74p. 2000

CONTRADROGAS, Perú 1999. Resumen Ejecutivo. Encuesta Nacional sobre Prevención y Uso de Drogas, 1998 - Lima. CONTRADROGAS - INEI. 57 pp.

CONTRADROGAS, Perú 1999. Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas. Informe General 1998. Lima, CONTRADROGAS, INEI, PNUFID. 184 pp.

Ferrando, D., 1988 Uso De Drogas en las Ciudades del Perú. Encuesta de Hogares - 1988. Monografía de Investigación, 1988. Lima: CEDRO.

Miguez H. 2001. Informe de resultados del Global Youth Tobacco Survey en Buenos Aires, Argentina. [citado 20-12-2001] [13 pantallas]. URL: http://www.cdc.gov/tobacco/global/GYTS/reports/arentina_sp.htm

Rojas A., M. Los Líderes Peruanos de Opinión Pública y el Problema de las Drogas. Un estudio de opiniones, actitudes y valores sobre la temática de las drogas. Lima, CEDRO, Monografía de Investigación No 13. 370 pp. 1996

Rojas A., M.; Castro de la Mata, R. Epidemiología de Drogas en la Población Urbana Peruana 1997. Lima, CEDRO. Monografía de investigación 17. 325 PP. 1999

Rojas, A.; Castro De La Mata, R. Epidemiología de Drogas en la Población Urbana Peruana 1995. Lima, CEDRO. Monografía de investigación 15. 255 PP. 1997

Organización Panamericana de la Salud. 1992. Tabaco o Salud: El Tabaco en la Región de las Américas. Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud. 1998. Estadísticas de Salud de las Américas. Edición de 1998. Washington: Organización Panamericana de la Salud. : 463.

WHO, 1997. Tobacco or Health: first global status report Tobacco or health program. WHO, Geneva, Switzerland.

WHO, 1998. Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic. WHO, Geneva, Switzerland.

WHO, 1999. Making a Difference. World Health Report, Geneva, Switzerland.

WHO 1999. Information Fact Sheets; Tobacco – Health Facts; ; [citado 20-12-2001] [13 pantallas]. URL: <http://www.who.int/inf-fs/en/fact221.html>

WHO 1999. Information Fact Sheets; Tobacco Dependence; ; [citado 18-12-2001] [2 pantallas]. URL: <http://www.who.int/inf-fs/en/fact222.html>