

# VIH/SIDA en los Estados Unidos

DATOS DE LOS CDC SOBRE EL VIH/SIDA


AGOSTO DE 2008

Se calcula que a finales del 2003 \* vivían en Estados Unidos entre 1,039,000 y 1,185,000 personas con VIH/SIDA [1]. En el 2006, se diagnosticaron 35,314 nuevos casos de VIH/SIDA en adultos, adolescentes y niños en los 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del VIH [2]. Los CDC han creado un sistema nuevo e innovador diseñado para calcular el número de nuevas infecciones por el VIH (o su incidencia) en Estados Unidos durante un año dado. Con esta nueva tecnología, los CDC estiman que en el 2006 se presentaron 56,300 nuevos casos de infecciones por el VIH en Estados Unidos [3].

## Por sexo

En el 2006, casi tres cuartas partes de los casos de VIH/SIDA diagnosticados en adolescentes y adultos pertenecían a hombres.

## Sexo de los adultos y adolescentes a quienes se les diagnosticó el VIH/SIDA durante el 2006





Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del VIH.

## Por categoría de transmisión

En el 2006, los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres (HSH, conocidos también como MSM, por sus siglas en inglés) representaron la proporción más grande de casos de VIH/SIDA diagnosticados entre hombres y adolescentes, seguida por las personas infectadas a través del contacto heterosexual de alto riesgo.

## Categorías de transmisión entre adultos y adolescentes a quienes se les diagnosticó el VIH/SIDA en el 2006



Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del VIH.

\*El año más reciente del cual se tienen datos estadísticos.



1-800-CDC-INFO (232-4636)  
En inglés y español  
24 horas al día  
cdcinfo@cdc.gov  
<http://www.cdc.gov/hiv>



## REFERENCIAS

1. Glynn M, Rhodes P. Estimated HIV prevalence in the United States at the end of 2003. National HIV Prevention Conference; June 2005; Atlanta. Abstract T1-B1101. <http://www.aegis.com/conferences/NHIVPC/2005/T1-B1101.html>.
2. CDC. HIV/AIDS Surveillance Report, 2006. Vol. 18. Atlanta: US Department of Health and Human Services, CDC; 2008. <http://www.cdc.gov/hiv>.
3. Hall HI, Ruiguang S, Rhodes P, et al. Estimation of HIV incidence in the United States. *JAMA*. 2008;300:520-529.



## RECURSOS SOBRE EL VIH/SIDA

### CDC VIH/SIDA

<http://www.cdc.gov/hiv>  
Recursos de los CDC sobre el VIH/SIDA

### CDC-INFO

1-800-232-4636  
Información acerca de los riesgos personales y adónde ir para hacerse la prueba del VIH

### Centro Nacional de Recursos para la Prueba del VIH de los CDC

<http://www.hivtest.org>  
Lugares donde se hacen las pruebas del VIH

### Centro Nacional de Prevención e Información de los CDC

1-800-458-5231  
<http://www.cdcnpi.org>  
Recursos, asistencia técnica y publicaciones de los CDC


### AIDSinfo

1-800-448-0440  
<http://www.aidsinfo.nih.gov>  
Recursos sobre el tratamiento del VIH/SIDA y ensayos clínicos

## Por raza y grupo étnico

Aunque los negros o afroamericanos representan solo el 13% de la población en los 33 estados, este grupo poblacional constituyó casi la mitad del número estimado de casos de VIH/SIDA diagnosticados durante el 2006.

### Raza/grupo étnico de las personas (incluidos los niños) a quienes se les diagnosticó el VIH/SIDA en el 2006




Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del VIH.

## Por edad

En el 2006, las personas de 25 a 34 años y las de 35 a 44 años representaron la proporción más grande de nuevos casos de VIH/SIDA diagnosticados.

### Edad de las personas a quienes se les diagnosticó VIH/SIDA durante 2006



Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del VIH.

## Tendencias en el número de casos diagnosticados de SIDA y en las muertes por esta enfermedad

Gracias a los avances en el tratamiento de la infección por el VIH logrados entre mediados y finales de la década de 1990, se redujo la progresión del VIH a SIDA y disminuyó considerablemente el número de muertes entre personas con SIDA en los 50 estados y el Distrito de Columbia. En general, la tendencia en el número estimado de casos de SIDA y muertes a causa de esta enfermedad se mantuvo estable en el 2005. Las estimaciones del 2006 indican que el número de casos de SIDA se mantuvo estable y que el número de muertes disminuyó; sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar si se mantendrá esta tendencia. La disponibilidad de mejores tratamientos también ha permitido que un mayor número de personas vivan con SIDA.

### Número estimado de casos de SIDA diagnosticados, muertes y personas que vivían con SIDA entre 2002 y 2006

	2002	2003	2004	2005	2006	Cifras acumuladas 1981-2006
Casos de SIDA diagnosticados	38,132	38,538	37,726	36,552	36,828	982,498
Muertes de personas con SIDA	16,948	16,690	16,395	16,268	14,016	545,805
Número de personas que vivían con SIDA	350,419	372,267	393,598	413,882	436,693	NP

NP, no pertinente (los valores anuales son acumulados).  
Según datos de 50 estados y el Distrito de Columbia.