



Información para el paciente: Ciprofloxacina 500-mg - Tableta oral Ciprofloxacina - Suspensión oral

Spanish translation of: Patient Information: Ciprofloxacin
(<http://www.bt.cdc.gov/agent/anthrax/treatment/cipropatient.asp>)

Tome esta medicina como lo indica la receta.

La ciprofloxacina, conocida comúnmente como cipro, pertenece a la clase de medicamentos llamados antibióticos quinolónicos. La misma ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (*Food and Drug Administration* o FDA) para tratar y proteger a las personas expuestas a las esporas del ántrax.

Cómo tomar la cipro

ADULTOS: tomar 1 tableta cada 12 horas según las instrucciones médicas.

NIÑOS: las dosis para los niños dependen de su peso. Déle la medicina a su hijo de acuerdo con las instrucciones del médico.

Lo mejor es tomar la cipro 2 horas antes o 2 horas después de comer, con por lo menos un vaso grande de agua. Sin embargo, si esto le crea malestar estomacal, puede tomar la cipro junto con los alimentos. No tome productos lácteos, como leche o yogurt, por lo menos 3 horas antes y 3 horas después de tomar la medicina. Si toma vitaminas o antiácidos como Tums o Maalox, tómelos 6 horas antes o 2 horas después de tomar la cipro.

Si se le olvida tomar una de las dosis, empiece de nuevo a tomar una tableta cada 12 horas. No tome 2 tabletas por la dosis que olvidó tomar. *Tómese todas las tabletas, aun si se siente bien, a menos que el médico le diga que deje de tomarlas. Si deja de tomar esta medicina antes de tiempo, podría sentirse mal.*

Efectos secundarios

Los efectos secundarios más comunes que causa la cipro son malestar estomacal, vómito, diarrea, cansancio, mareos y dolor de cabeza. Si usted tiene problemas con cualquiera de estos síntomas, hable con su médico. Algunos de los efectos secundarios menos comunes son dolor en los brazos y las piernas, alteraciones de la vista, inquietud, zumbido en los oídos y alteraciones del ánimo. Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato.

Las reacciones alérgicas fuertes son muy poco comunes. Los signos de una reacción alérgica pueden ser sarpullido, comezón, inflamación de la lengua, las manos y los pies, fiebre, y dificultad para respirar. Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato.

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A LOS NIÑOS: en los bebés y los niños menores de 18 años de edad, esta medicina puede causar problemas en las articulaciones. Si a su hijo le duelen las articulaciones mientras está tomando cipro, informe a su médico.

Precauciones

- Asegúrese de informar la médico si usted es alérgico a alguna medicina.

Información para el paciente: Ciprofloxacina 500-mg - Tableta oral Ciprofloxacina - Suspensión ora

(continuación de la página anterior)

- Es muy importante que informe al médico sobre **TODAS** las medicinas está tomando actualmente, incluidas las pastillas que compró en la tienda como, por ejemplo, vitaminas y antiácidos.
- Dígale al médico si alguna vez ha tenido convulsiones, un accidente cerebrovascular, problemas en los riñones, articulaciones y tendones, el hígado o la vista. Dígale también si en algún momento sufrió de sangrado o moretones inusuales.
- Si esta medicina le produce mareo, tenga cuidado al conducir o al hacer labores que requieren que usted esté alerta. No tome bebidas alcohólicas en este caso, pues los mareos empeorarán.
- La cipro puede hacer que la piel se vuelva sensible al sol, lo cual aumenta las posibilidades de quemaduras graves. Evite estar al sol lo más que pueda. Cuando esté al aire libre, use camisas de manga larga y un sombrero, y siempre aplíquese un bloqueador solar (30 SPF).
- En las mujeres, la cipro puede causar comezón y flujo vaginales, lo cual se conoce comúnmente como candidiasis. Si esto ocurre, dígaselo al médico.
- Informe a su médico si está embarazada o amamantando.
- No se sabe con certeza si se puede tomar cipro durante el embarazo sin problema alguno. Informe a su médico si está embarazada o podría quedar embarazada. Asimismo, hágale saber si está amamantando.
- La cipro puede aumentar los efectos de la cafeína y de la teofilina (una medicina).

Para más información, visite <http://www.bt.cdc.gov/agent/anthrax/espanol/>, o llame a los CDC al 800-CDC-INFO (español e inglés) o 888-232-6348 (TTY).