

An Ninh Sinh Học Sau Vườn

6 Phương Cách để Ngừa Bệnh Gia Cầm

1 Giữ Một Khoảng Cách.

Giới hạn việc tiếp cận với nhà cửa và gia cầm của quý vị. Nghĩ đến việc rào khu vực nơi nuôi giữ gia cầm của mình lại và làm thành một khu vực ngăn cách nếu có thể được. Chỉ có những người nào chăn nuôi gia cầm của mình mới được phép vào tiếp xúc với chúng. Nếu khách thăm viếng có nuôi gia cầm riêng, đừng để khách và gia cầm của họ lại gần gia cầm của mình. Không cho các loài chim dùng để săn bắn và các loài chim nước rày đây mai đó được tiếp xúc với gia cầm của mình vì chúng có thể mang vi trùng và mầm bệnh.



2 Giữ Cho Sạch Sẻ.

Mặc quần áo sạch, cọ rửa giày bằng thuốc khử trùng, và rửa tay thật sạch trước khi vào khu vực nuôi gia cầm của quý vị. Lau chùi chuồng nuôi và thay thức ăn và nước uống hàng ngày. Chùi rửa và khử trùng dụng cụ tiếp xúc với gia cầm hoặc phân của chúng, kể cả chuồng nuôi và dụng cụ. Dọn phân chuồng đi nơi khác trước khi khử trùng. Vứt bỏ đúng cách các con gia cầm chết.



3 Đừng Lôi Kéo Bệnh Tật Về Nhà.

Nếu quý vị đã từng lại gần các con gia cầm khác hoặc những người chủ gia cầm, như tại một tiệm bán đồ ăn cho súc vật, hãy chùi rửa và khử trùng lốp xe hơi và lốp xe tải, các chuồng nuôi gia cầm, và dụng cụ trước khi đi về nhà. Quý vị có từng đem các con gia cầm của mình đi dự các buổi tổ chức chợ phiên hoặc triển lãm hay không? Tách riêng chúng khỏi các con gia cầm khác trong bấy ít nhất là 2 tuần sau dịp tổ chức này. Các con gia cầm mới cần phải được nhốt riêng biệt khỏi bấy ít nhất là 30 ngày.



4 Đừng Mang Bệnh Tật Từ Láng Giềng Về Nhà.

Đừng dùng chung các dụng cụ làm cỏ và vườn tược, các dụng cụ, hoặc tiếp liệu cho gia cầm với những người láng giềng hoặc các chủ gia cầm khác. Nếu quý vị đem những vật dụng này về nhà, hãy chùi rửa và khử trùng các dụng cụ này trước khi đem về đến nhà.



5 Biết Các Dấu Hiệu Cảnh Báo về Các Căn Bệnh Hay Lây của Gia Cầm.

- Sự gia tăng đột ngột số gia cầm chết trong bầy
- Hắt hơi, thở hổn hển, ho, và chảy nước mũi
- Tiêu chảy ra toàn là nước và có màu xanh lá cây
- Thiếu nhựa sống và biếng ăn
- Đẻ trứng ít đi hoặc ra các loại trứng bị biến dạng mềm hoặc mỏng vỏ
- Sưng xung quanh mắt, cổ, và đầu
- Màu thịt nơi yếm, mào, và cẳng chân (AI) đổi thành màu tím
- Run rẩy, cánh bị rú xuống, đi vòng vòng, vận vẹo nơi đầu và cổ, hoặc kém di động (END)

Điều quan trọng là phải phát hiện sớm để ngăn ngừa lây lan bệnh tật.



6 Báo Cáo Các Con Chim Bệnh.

Đừng chờ đợi. Nếu gia cầm của quý vị bị bệnh hoặc sắp chết, hãy gọi cho văn phòng nối dài hợp tác địa phương, bác sĩ thú y địa phương, Bác Sĩ Thú Y Tiểu Bang, hoặc văn phòng các Dịch Vụ Thú Y thuộc Bộ Canh Nông Hoa Kỳ (USDA) để tìm hiểu lý do tại sao. USDA có đường dây khẩn miễn phí **(1-866-536-7593)** gọi cho các bác sĩ thú y để giúp đỡ quý vị. Dịch vụ này miễn phí.



Quý vị là người bảo vệ tốt nhất cho các con gia cầm của mình.

Backyard Biosecurity

6 Ways To Prevent Poultry Diseases

1 Keep Your Distance.

Restrict access to your property and your birds. Consider fencing off the area where you keep your birds and make a barrier area if possible. Allow only people who take care of your birds to come into contact with them. If visitors have birds of their own, do not let them near your birds. Game birds and migratory waterfowl should not have contact with your flock because they can carry germs and diseases.



2 Keep It Clean.

Wear clean clothes, scrub your shoes with disinfectant, and wash your hands thoroughly before entering your bird area. Clean cages and change food and water daily. Clean and disinfect equipment that comes in contact with your birds or their droppings, including cages and tools. Remove manure before disinfecting. Properly dispose of dead birds.



3 Don't Haul Disease Home.

If you have been near other birds or bird owners, such as at a feed store, clean and disinfect car and truck tires, poultry cages, and equipment before going home. Have your birds been to a fair or exhibition? Keep them separated from the rest of your flock for at least 2 weeks after the event. New birds should be kept separate from your flock for at least 30 days.



4 Don't Borrow Disease From Your Neighbor.

Do not share lawn and garden equipment, tools, or poultry supplies with your neighbors or other bird owners. If you do bring these items home, clean and disinfect them before they reach your property.



5 Know the Warning Signs of Infectious Bird Diseases.

- Sudden increase in bird deaths in your flock
- Sneezing, gasping for air, coughing, and nasal discharge
- Watery and green diarrhea
- Lack of energy and poor appetite
- Drop in egg production or soft- or thin-shelled misshapen eggs
- Swelling around the eyes, neck, and head
- Purple discoloration of the wattles, combs, and legs (AI)
- Tremors, drooping wings, circling, twisting of the head and neck, or lack of movement (END)

Early detection is important to prevent the spread of disease.



6 Report Sick Birds.

Don't wait. If your birds are sick or dying, call your local cooperative extension office, local veterinarian, the State Veterinarian, or U.S. Department of Agriculture (USDA) Veterinary Services office to find out why. USDA operates a toll-free hotline (1-866-536-7593) with veterinarians to help you. There is no charge for this service.



You are the best protection your birds have.