

Fosamprenavir



Marca comercial: Lexiva

Clase de medicamento: Inhibidor de la proteasa

El fosamprenavir, conocido también como Lexiva, es una clase de medicamento llamado inhibidor de la proteasa (PI). Estos productos funcionan mediante bloqueo de la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El fosamprenavir fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 20 de octubre de 2003 para uso con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH-1. No cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Es un profármaco del amprenavir (Agenerase). El cuerpo lo convierte en amprenavir. Puesto que el fosamprenavir es más soluble en agua que el amprenavir, los pacientes pueden tomar menos píldoras y aún así lograr los mismos resultados que con el amprenavir.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas y puede tomarse con comida o solo.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada de fosamprenavir depende del tratamiento previo que haya recibido un paciente para la infección por el VIH o de si ese producto es parte de la primera combinación de medicamentos contra el VIH. Cuando se trate de pacientes adultos que toman su primera combinación de medicamentos contra el VIH, hay tres formas de administrar la dosis de fosamprenavir: 1) 1.400 mg dos veces al día sin ritonavir, 2) 1.400 mg una vez al día junto con 200 mg de ritonavir una vez al día ó 3) 700 mg dos veces al día junto con 100 mg de ritonavir dos veces al día. Para los pacientes que ya han tomado medicamentos contra el VIH, la dosis recomendada de fosamprenavir es de 700 mg dos veces al día junto con 100 mg de ritonavir dos veces al día. No se ha determinado cuáles son las dosis inocuas y eficaces en pacientes pediátricos.

Algunos pacientes pueden beneficiarse de diferentes dosis de fosamprenavir y ritonavir. Los

pacientes deben tomar siempre esos dos medicamentos de la forma recetada por el médico.

Contraindicaciones

Se debe informar al médico sobre cualquier problema de salud antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el fosamprenavir puede causar algunos efectos adversos graves, incluso erupción cutánea grave. Es preciso avisar al médico de inmediato si un paciente tratado con fosamprenavir presenta ese tipo de erupción. Otros efectos secundarios graves que deben informarse al médico comprenden cambios en la distribución de la grasa corporal, hipercolesterolemia, aumento de la hemorragia en pacientes con hemofilia, elevación de las concentraciones de azúcar en la sangre y comienzo o empeoramiento de la diabetes. Se debe informar al médico si se presenta cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves cabe citar depresión, diarrea, erupción cutánea leve, náusea, adormecimiento de las manos, los pies, la boca o los labios, dolor de estómago, alteración del sentido del gusto, cansancio poco común, alteración del estado de ánimo y vómito. Se debe informar al médico si esos efectos continúan o causan molestias.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Fosamprenavir



De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m.,
hora del este

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian FOSAMPRENAVIR, visite el sitio web de AIDSinfo:

<http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba FOSAMPRENAVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Fosamprenavir AND HIV infections.

Fabricantes

Fosamprenavir
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Fosamprenavir
Vertex Pharmaceuticals Inc
130 Waverly Street
Cambridge, MA 02139-4242
(617) 577-6000

Lexiva
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help