

Avian Influenza

Avian Influenza (AI) or “bird flu” is a contagious disease that can infect all types of birds.

Know the Signs of AI

- Sudden death without clinical signs
- Lack of energy and appetite
- Decreased egg production and/or soft-shelled or misshapen eggs
- Swelling of the head, eyelids, comb, wattles, and hocks
- Purple discoloration of the wattles, combs, and legs
- Nasal discharge, coughing, sneezing
- Incoordination
- Diarrhea

How AI Spreads

AI spreads quickly by bird-to-bird contact. Viruses can be carried by manure, equipment, vehicles, egg flats, crates, clothing, shoes, and people who have come in contact with the virus. Migratory waterfowl can also carry the disease.

Practice Backyard Biosecurity

To prevent the possible spread of disease:

- Restrict traffic onto and off your property.
- Disinfect shoes, clothes, hands, egg trays or flats, crates, vehicles, and tires.
- Avoid visiting other poultry farms or bird owners.

Smart Practices When Buying Birds

Buy from a reputable dealer; request certification from suppliers that birds were legally imported; maintain records of all sales and shipments of flocks; keep new birds separated from your flock for at least 30 days; keep young and old birds and birds of different species and from different sources apart.

Report Sick Birds at 1-866-536-7593.

If your birds are sick or dying, call your local cooperative extension service, your local veterinarian, the State Veterinarian's office, or the U.S. Department of Agriculture's (USDA) Veterinary Services toll-free at **1-866-536-7593** to find out why.

You are the best protection your birds have.

Influenza Aviar

La influenza aviar (AI) o “gripe aviar” es una enfermedad contagiosa que puede infectar a todo tipo de aves.

Reconozca las señales de la AI

- Muerte súbita sin señales clínicas
- Falta de energía y apetito
- Disminución de la postura, huevos con cáscara blanda o deformes
- Edema de cabeza, párpados, crestas, papadas y tarsos
- Decoloración purpúrea de papadas, crestas y piernas
- Descargas nasales, tos, estornudos
- Descoordinación
- Diarrea

Cómo se propaga la AI

Esta enfermedad se propaga rápidamente por el contacto entre las aves. El virus puede ser transportado en excrementos, equipos, vehículos, cajas de huevos, cajones, ropas, calzado, así como por personas que hayan estado en contacto con el virus. Las aves acuáticas migratorias también pueden ser portadoras de la enfermedad.

Ponga en práctica la bioseguridad doméstica

Para prevenir la posible propagación de la enfermedad:

- Restrinja el tráfico desde y hacia su propiedad.
- Desinfecte calzado, ropas, manos, bandejas o cajas de huevos, vehículos y cubiertas.
- Evite visitar otros establecimientos de aves de corral o a propietarios de aves.

Prácticas inteligentes cuando se adquieren aves

Realice sus compras a un comerciante de buena reputación; exija a sus proveedores la certificación que demuestre la importación legal de las aves; mantenga registros de todas las ventas y los traslados de bandadas; mantenga las aves nuevas separadas de su bandada por al menos 30 días; mantenga separadas las aves jóvenes, las más viejas, las de especies diferentes y las aves de distintos orígenes.

Informe la presencia de aves enfermas al 1-866-536-7593.

Si sus aves están enfermas o muriendo, llame a su servicio cooperativo de extensión, a su veterinario local, a la oficina del Veterinario del Estado, o llame sin cargo al Servicio Veterinario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) al: **1-866-536-7593**, para averiguar las causas.

Usted es la mejor protección que tienen sus aves.