

¡Mejor prevenir que no oír!

Para un mejor futuro dale a tu bebé un comienzo seguro

¿Tienes motivos para creer que tu hijo pueda tener problemas de audición?

Es posible que tu hijo tenga problemas de audición si:

- Pasó más de 5 días en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos o presentó complicaciones mientras estaba siendo atendido en esta unidad. (Pregúntale a tu médico)
- Requirió un procedimiento especial (transfusión de sangre) para tratar la ictericia (aumento en el nivel de la bilirrubina).
- Estuvo expuesto a alguna infección antes de nacer
- La cabeza, la cara o las orejas se han desarrollado o tienen una forma diferente a lo normal.
- Tiene algún trastorno neurológico que está relacionado con la pérdida de la audición. (Pregúntale a tu médico)
- Tuvo una infección llamada meningitis que afecta las capas que cubren el cerebro y la médula espinal.
- Se golpeó tan fuerte la cabeza que necesitó atención médica.
- Se le administraron medicamentos como los usados en la quimioterapia para el cáncer o de otro tipo que pueden afectar la audición. (Pregúntale a tu médico)
- Alguien en tu familia tuvo o tiene problemas de audición que aparecieron en la niñez.
- o
- Por cualquier razón piensas que tu hijo tiene problemas para oír.

Year 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention Programs
Joint Committee on Infant Hearing



Para más información
consulta a tu médico

Haz una cita

Revisa la audición de
tu hijo cada 6 meses



Programa de detección auditiva e
intervención tempranas
Early Hearing Detection and Intervention (EHDI)

www.cdc.gov/ncbddd/ehdi/spanish