

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) Organización Panamericana de la Salud. La Salud en Las Americas. Washington: OPS; 2001.
- (2) Resolución No. 07559 del 12 de Junio de 1984 del Ministerio de Salud por la cual se crea el Consejo Nacional de Cigarrillo o salud.
- (3) Rodríguez E. Ronderos M. El hábito de fumar en Colombia. 1977-1980. Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cancerología. Bogota: Editorial Gente Nueva; 1988.
- (4) Rodríguez E. Duque LF. Rodríguez J. Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Fundación Santafé. Escuela Colombiana de Medicina. Bogota: Dirección Nacional de Estupefacientes; 1993.
- (5) Fundación Santa Fe de Bogota. Dirección Nacional de estupefacientes. Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 1996. Bogota: Dirección Nacional de estupefacientes; 1997.
- (6) Instituto de Seguros Sociales. Profamilia Consumo de tabaco y alcohol según encuesta de conocimientos actitudes y practicas. Tomo VI . Bogotá: Instituto de Seguros Sociales;1994.
- (7) Colombia, Ministerio de Salud. III Estudio Nacional de Salud Bucal. ENSAB III. II Estudio Nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas – Serie Documento técnicos. ENFREC II. Colombia: Ministerio de Salud; 1999.
- (8) Banco Mundial. Curbing the epidemic: Governments and the Economics of Tobacco control. Washington, 1999.
- (9) National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Global Tobacco Prevention and Control. Global Youth Tobacco Survey (GYTS).En: <http://www.cdc.gov/tobacco/global/gvts.htm>.
- (10) Bogotá. Secretaria Distrital de Educación. Base de datos 2000.

- (11) Samet J. Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. Rev Salud Publica de México 2002; 44 (suppl) 144-159.
- (12) McNeill A. Preventing the Onset of Tobacco Use. In: The Tobacco Epidemics. (Bollinger CT, Fagerstrom. Editors). Basel: Karger; 1997.
- (13) Hammond R, Rowell A. USA Smoking and Health. Confie en nosotros, somos la industria tabacalera. Washington: Campaign for Tobacco –free kids. London .Action on Smoking and Health. 2001; p.8.
- (14) U.S. Department of Health and Human Services. Reducing Tobacco Use. A Report of the Surgeon General U.S. Washington: Government Printing Office; 2000.
- (15) GYTS Collaborative Group. Tobacco use among youth: a cross country comparison. Tobacco Control 2002; 11:252-270.
- (16) Sansores R. Giraldo-Buitrago F, Valdemar-Vazques, Ramírez-Venegas A, Sandoval R. Impacto de los medios de comunicación masiva en una campaña antitabaco. Salud publica de México 2002; 44 (Suppl):101-108.
- (17) Medina Mora ME, Peña Corona MC, Cravioto P, Villatoro J, Kuri P. Del tabaco al uso de otras drogas; ¿el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras drogas? Salud Publica de México 2002; 44(Suppl): 109-124.
- (18) Peruga A. Tres medidas fundamentales para revitalizar el control del tabaquismo en las Americas. Revista Panamericana de Salud Publica 2002; 11(2):72-75.

Agradecimientos:

A la Secretaria Distrital de Educación y de Salud por su apoyo y aprobación y un reconocimiento especial a todos los colegios distritales, directores profesores y alumnos que aceptaron la invitación a participar en este estudio. Especial agradecimiento a Silvia Gutierrez por su participación y al grupo de políticas y programas por el apoyo prestado para la realización de la encuesta y la redacción del informe particularmente a Sandra Tovar, Carmen Sofía Riveros.

Agencias que financiaron la encuesta EMTAJOVEN

Organización Mundial de la Salud.

Derek Yach, Luisa da Costa e Silva, Leanne Riley, Michael P Eriksen

Centres for Disease Control and Prevention.

Wick Warren, coordinador general de la Encuesta EMTAJOVEN. Grupo Técnico: Juliette Lee, La

Tisha Lord, Ralph Caraballo.