

Estavudina



Marca comercial: Zerit

Clase de medicamento: Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósidos

La estavudina, conocida también como Zerit o d4T, es un tipo de medicamento llamado inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos (NRTI, por sus siglas en inglés). Esta clase de medicamentos bloquea la transcriptasa inversa, una proteína que el VIH necesita para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA Posibles efectos secundarios

El 24 de junio de 1994, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la estavudina para uso con otros antirretrovirales en el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños. También puede emplearse para prevenir la infección por el VIH en trabajadores de salud y otras personas después del contacto accidental con el virus en el lugar de empleo; sin embargo, este uso no está autorizado por la FDA. La estavudina no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA, tampoco reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

La estavudina viene en líquido y en cápsulas para administración oral.

Dosis diaria recomendada

La dosis diaria recomendada de estavudina depende del peso corporal. Los pacientes que pesan 132 libras o más deben tomar 40 mg dos veces al día; los pacientes que pesan menos de 132 libras deben tomar 30 mg dos veces al día. El medicamento se debe tomar cada 12 horas. La dosis para niños también depende del peso corporal.

Algunos pacientes pueden beneficiarse de diferentes dosis de estavudina. Los pacientes en diálisis o que tienen disminución de la función renal podrían necesitar tomar una dosis más baja. Siempre se debe tomar el medicamento tal como lo receta el médico.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedad de los riñones o del hígado o inflamación del páncreas deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Además de sus efectos deseables, este medicamento puede causar algunos efectos adversos. Es preciso informarle al médico si ocurre alguno de los siguientes efectos secundarios graves: ardor, insensibilidad, dolor u hormigueo en las manos, los brazos, los pies o las piernas; fiebre; dolor de las articulaciones o los músculos; náuseas, dolor intenso del estómago; erupción cutánea; o vómito.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios leves de este medicamento están: escalofríos y fiebre, diarrea, dolor de cabeza, falta de apetito o pérdida de peso, dolor leve del estómago, redistribución de la grasa en el cuerpo, dificultad para dormir, cansancio o debilidad poco comunes. Es preciso informarle al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian ESTAVUDINA, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba ESTAVUDINA. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba

Estavudina



Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento (cont.)

Estavudina AND HIV infections.

Fabricantes

Stavudine

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Zerit

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este