

Dipivoxilo de adefovir



Marca comercial: Hepsera

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El dipivóxilo de adefovir, también conocido como Hepsera, pertenece a la clase de medicamentos llamados antivíricos. Los antivíricos destruyen los virus o impiden que los virus se multipliquen. El adefovir es un análogo del nucleótido que bloquea la polimerasa del ADN del virus de la hepatitis B (VHB), una proteína que ese virus necesita para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

El dipivoxilo de adefovir está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de la infección crónica por el VHB, una coinfección común en pacientes con VIH/SIDA.

Presentación/Administración

El dipivoxilo de adefovir se fabrica en tabletas de administración oral.

Contraindicaciones

Las personas con algún problema médico, deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el dipivóxilo de adefovir puede causar algunos efectos adversos. Aunque no se conocen todos estos efectos secundarios, se han reportado los siguientes: dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea, diarrea, hinchazón abdominal, indigestión y gases estomacales. Entre los efectos adversos más graves están: pérdida del control muscular, cansancio inusual, dificultades respiratorias, mareos, coloración amarillenta de los ojos o la piel, orina oscura, y falta de apetito. Las personas deben informarle al médico si presentan cualquiera de estos efectos secundarios.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian DIPIVOXILO DE ADEFOVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba DIPIVOXILO DE ADEFOVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Dipivoxilo de adefovir AND HIV infections.

Fabricantes

Hepsera
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Adefovir dipivoxil
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este