

Entecavir



Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El entecavir, conocido también como Baraclude, pertenece a la clase de medicamentos llamados antivíricos. Estos medicamentos destruyen los virus o les impiden multiplicarse. Las infecciones ocurridas en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas infectadas por el VIH o con SIDA, tienden a ser más graves y se llaman infecciones oportunistas.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA Posibles efectos secundarios

El entecavir fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el 30 de marzo de 2005 para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, una coinfección común en las personas infectadas por el VIH. Aunque el uso del entecavir no está indicado para el tratamiento de personas infectadas por el VIH, este medicamento podría inhibir de manera parcial, la duplicación del VIH cuando se usa en el tratamiento de la infección crónica por hepatitis B. Se requieren más estudios para determinar el efecto de este medicamento contra el VIH.

Este medicamento no cura ni previene la infección por el VIH o el SIDA, ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

El entecavir se fabrica en tabletas y en suspensión de administración oral y se toma sin comida. Debe tomarse por lo menos 2 horas antes y 2 horas después de comer.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada para los adultos es de tabletas de 0,5 mg o suspensión oral una vez al día. Los pacientes con deficiencia renal podrían necesitar una dosis menor una vez al día.

Contraindicaciones

Las personas deben informarle al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento. Los pacientes con reducción de la tasa de depuración de la creatinina pueden necesitar un ajuste de la dosis de entecavir.

Además de sus efectos deseables, el entecavir puede causar algunos efectos adversos. Aunque no todos ellos se conocen, se han notificado dolor de cabeza, cansancio o debilidad poco comunes, mareo y náusea.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian ENTECAVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba ENTECAVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Entecavir AND HIV infections.

Fabricantes

Entecavir
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Entecavir



Fabricantes (cont.)

Baraclude
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este