

Anfotericina B



Marca comercial: Fungizone, Amphocin

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

La anfotericina B, también conocida como Fungizone o Amphocin, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicóticos. Los hongos son microorganismos causantes de infección en el ser humano. Los antimicóticos eliminan los hongos o les impiden multiplicarse. Las micosis (infecciones causadas por hongos) ocurren en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas infectadas por el VIH, con más frecuencia que en personas con un sistema inmunitario sano. Las micosis pueden ser también más graves en pacientes con un sistema inmunitario débil, incluso en personas infectadas por el VIH.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

La anfotericina B está autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para el tratamiento de ciertos tipos de micosis graves. También se usa para prevenir futuras micosis en pacientes infectados por el VIH que han tenido micosis graves en el pasado.

Presentación/Administración

La anfotericina B se fabrica en polvo para mezclarse con agua estéril y dextrosa e inyectarse por medio de infusión intravenosa. La anfotericina B debe ser administrada por un médico o enfermera.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedad de los riñones o que reciban quimioterapia o radioterapia deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

La mayoría de las personas que toman anfotericina B sufren efectos indeseables. Los dos efectos secundarios más comunes son una mala reacción al medicamento y problemas renales.

Cuando se administra la anfotericina B por vía intravenosa, los pacientes pueden tener fiebre, escalofríos con temblor, baja tensión arterial, falta de apetito, náusea, vómito, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Eso suele ocurrir de 1 a 3 horas después de recibir la anfotericina B. Raras veces la anfotericina B puede causar una reacción alérgica más grave.

Los problemas renales son un efecto secundario

común en las personas tratadas con anfotericina B. Por lo general, la función renal se normaliza después de que las personas dejan de tomarla. Sin embargo, quizá necesiten suspenderla y cambiar a otro medicamento por causa de lesiones renales. Se han fabricado otras formas de anfotericina B que no dañan los riñones tanto como la anfotericina B tradicional. Esas formas se venden con los nombres de AmBisome, Abelcet y Amphotec. Las personas que no pueden tomar anfotericina B tradicional quizá puedan tomar alguna de esas otras formas.

La anfotericina B también puede causar respiración sibilante o dificultad respiratoria; opresión torácica, erupción cutánea, prurito; irregularidad en los latidos del corazón; calambres o dolores musculares; dolor en el sitio de inyección; dolor de garganta; cansancio o debilidad poco comunes; hemorragia o hematomas poco comunes; adormecimiento, hormigueo, dolor o debilidad de las manos o los pies; pérdida de la audición o silbidos en los oídos; y visión borrosa o doble.

Las personas deben informarle al médico sobre cualquier síntoma de esos efectos secundarios. Las personas que tomen este medicamento deben consultar con el médico sobre otros medicamentos que puedan tomar para reducir esos efectos secundarios.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian ANFOTERICINA B, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga

Anfotericina B



Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba ANFOTERICINA B Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Anfotericina B AND HIV infections.

Fabricantes

Fungizone

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Amphotericin B

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Amphocin

Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Abelecet

Enzon, Inc.
20 Kingsbridge Road
Piscataway, NJ 08854-3969
(908) 541-8600

Amphotec

Oryx Pharmaceuticals Inc.
6500 Kitimat Road
Mississauga, Ontario, Canada

AmBionne

Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este