

Darunavir

Marca comercial: Prezista

Clase de medicamento: Inhibidor de la proteasa

El darunavir, conocido también como Prezista o TMC114, es un tipo de medicamento llamado inhibidor de la proteasa. Estos productos funcionan mediante bloqueo de la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El 23 de junio de 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el darunavir para que sea administrado junto con el ritonavir, para uso con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección del VIH en adultos. El darunavir no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

El darunavir, conocido también como Prezista o TMC114, es un tipo de medicamento llamado inhibidor de la proteasa. Estos productos funcionan mediante bloqueo de la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El 23 de junio de 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el darunavir para que sea administrado junto con el ritonavir, para uso con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección del VIH en adultos. El darunavir no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Tibotec provee el darunavir a través de un programa de acceso ampliado para pacientes internacionales con pocas o ninguna opción de tratamiento debido al fracaso virológico o para aquellos que no pueden tolerar ciertos regímenes medicamentosos contra el VIH. Los pacientes y profesionales de salud pueden visitar el sitio <http://www.tibotec.com> o llamar al teléfono 1-866-889-2074 para obtener más información.

Presentación/Administración

El darunavir se fabrica en tabletas para administración oral y debe tomarse con comida.

Dosis diaria recomendada



La dosis recomendada para adultos que nunca han recibido tratamiento es de 800 mg (dos tabletas de 400 mg) tomadas junto con ritonavir de 100 mg una vez al día con comida. La dosis recomendada para adultos que ya han recibido tratamiento es de 600 mg tomadas junto con ritonavir de 100 mg dos veces al día con comida. Algunos pacientes se pueden beneficiar de diferentes dosis de darunavir. Los pacientes deben siempre tomar el darunavir tal como se lo receta el médico.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseados, el darunavir puede causar algunos efectos adversos. Aunque no todos ellos se conocen, se han notificado entre los más comunes casos de diarrea, náuseas, cefalea y síntomas parecidos a los de la gripe, que incluye secreción nasal o dolor de garganta. Las personas deben informar al médico si experimentan alguno de estos síntomas. Además, se han notificado casos de inflamación del hígado, resultados anormales en las pruebas de la función hepática, sarpullido grave, fiebre y altas concentraciones anormales de colesterol y triglicéridos. Cuando se toman juntos darunavir y ritonavir se puede presentar lesión hepática, específicamente hepatitis instigada por el medicamento. Las señales y síntomas de lesión hepática incluyen resultados anormales en las pruebas de la función hepática, orina oscura, ictericia y sensibilidad del hígado. A los pacientes que tienen coinfección por hepatitis o que ya tienen resultados anormales en las pruebas de la función hepática se les debe hacer seguimiento detallado durante los primeros meses del tratamiento con darunavir y ritonavir. Raras veces se han notificado casos de hipersensibilidad que incluye inflamación facial y rbdomiólisis.

Darunavir



de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian DARUNAVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba DARUNAVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Darunavir AND HIV infections.

Fabricantes

Darunavir
Tibotec
1029 Stony Hill Road
Suite 300
Yardley, PA 19067
(877) 732-2488

Prezista
Tibotec
1029 Stony Hill Road
Suite 300
Yardley, PA 19067
(877) 732-2488

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes,