

Raltegravir



Clase de medicamento: Inhibidor de la integrasa

El raltegravir, conocido también como Isentress y MK-0518, es un tipo de medicamento llamado inhibidor de la integrasa. Los inhibidores de la integrasa funcionan mediante el bloqueo de la integrasa, una proteína que el VIH necesita para introducir su material genético dentro del material genético de una célula infectada.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA Posibles efectos secundarios

El raltegravir fue autorizado el 12 de octubre de 2007 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), para uso junto con otros medicamentos antirretrovirales en el tratamiento de la infección por el VIH en adultos. Es el primer inhibidor de la integrasa aprobado por la FDA. Este medicamento no cura ni previene la infección por el VIH o el SIDA, ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

En agosto del 2006, Merck estableció un programa de acceso ampliado a nivel mundial para pacientes infectados por el VIH con pocas opciones de tratamiento o carentes de ellas. Los pacientes y los profesionales de salud pueden llamar al 1-888-577-8839 ó pueden visitar <http://www.benchmark.com/secure/fr/> para más información.

Presentación/Administración

El raltegravir viene en tableta para tomar.

Dosis diaria recomendada

La dosis de raltegravir recomendada para adultos es 400 mg dos veces al día. Las dosis de 200, 400 y 600 mg han sido estudiadas en ensayos clínicos.

Algunas personas se pueden beneficiar de dosis diferentes de raltegravir. Las personas deben siempre tomar el medicamento tal como se lo recomienda el médico.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informarle al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Además de sus efectos deseados, el raltegravir puede causar algunos efectos indeseables. Aunque no todos ellos se conocen, los más comunes observados en los ensayos clínicos han sido diarrea, náuseas, dolor de cabeza y fiebre.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian RALTEGRAVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba RALTEGRAVIR Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Raltegravir AND HIV infections.

Fabricantes

Isentress
Merck & Company, Inc
One Merck Dr
P.O. Box 100
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
(800) 609-4618

Raltegravir



Fabricantes (cont.)

Raltegravir
Merck & Company, Inc
One Merck Dr
P.O. Box 100
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
(800) 609-4618

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este