

Paclitaxel



Marca comercial: Taxol, Onxol

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El paclitaxel, también conocido como Taxol, pertenece a la clase de medicamentos llamados antineoplásicos. Estos productos desaceleran o detienen la multiplicación de las células cancerosas.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA efectos secundarios continúan o son molestos.

El paclitaxel fue autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos el 4 de agosto de 1997 como tratamiento de segunda línea para el sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA.

Presentación/Administración

Se fabrica en líquido administrado en infusión intravenosa.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el paclitaxel puede causar algunos efectos adversos, incluso cansancio o debilidad poco comunes; enrojecimiento de la cara; erupción cutánea o picazón; dificultad respiratoria; fiebre o escalofrío; tos o ronquera; lumbago o dolor lateral; dolor o dificultad al orinar; deposiciones negras con apariencia de alquitrán; hemorragia o hematomas poco comunes; sangre en la orina o la materia fecal; pequeños puntos rojos en la piel; efectos cardíacos, tales como presión baja (hipotensión), baja tensión arterial o anomalías en el electrocardiograma; problemas del hígado; dolor o enrojecimiento del sitio de inyección; aftas en la boca o ampollas en los labios. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios del paclitaxel pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos cabe citar dolor de las articulaciones o los músculos, especialmente de los brazos y las piernas; diarrea, náusea y vómito; adormecimiento, quemazón u hormigueo de las manos o los pies; y pérdida del cabello. Los pacientes deben informarle al médico si esos

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian PACLITAXEL, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba PACLITAXEL. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Paclitaxel AND HIV infections.

Fabricantes

Paclitaxel
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Taxol
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Paclitaxel



Fabricantes (cont.)

Onxol

Teva Parenteral Medicines, Inc.
19 Hughes
Irvine, CA 92618-1902
(800) 729-9991

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este