



### ECP ມີໄວ້ເພື່ອການຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ

ຈະໃຊ້ ECP ບັນຍາຄຸມກຳເນີດທຳມະດາບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ: ຢ່າມີປັ້ນປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບວິທີຄຸມກຳເນີດທຳມະດາ.

ຖ້າທ່ານຮ່ວມເພດ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະດາ (ເຊັ່ນ ຢາເນັດຄຸມກຳເນີດ, ຖົງອະນາໄມ, ສິດຢາຄຸມກຳເນີດ ແລະວິທີອື່ນໆ)

ຢ່າມີສາມາດປ້ອງກັນອາການອັກເສບທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດແລະໂຮກ AIDS ໄດ້ ກັນອາການອັກເສບທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດແລະໂຮກ AIDS ໄດ້ ດີທີ່ສຸດ)

### ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດຮັບຢາ ECP ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ທ່ານສາມາດຮັບຢາ ECP ໄດ້ຈາກທ່ານໝໍຫຼືເຄີລີນິກຂອງທ່ານ, ທີ່ເຄີລີນິກປະຈຳຄຸມ ຫຼືເຄີລີນິກທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ໂທຫາທ່ານໝໍຫຼືເຄີລີນິກແລະບອກວ່າທ່ານຕ້ອງການຢາເນັດຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ ECP (Emergency Contraceptive Pills)

ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປບ່ອນໃດ, ໃຫ້ໂທຫາ:



ເລກໂທດ່ວນ ພຣະນາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ 1-888-668-2528

ສຳລັບພາສາອັງກິດແລະສະເປນເທົ່ານັ້ນ. ໝາຍເລກໂທດ່ວນນີ້ໃຫ້ບໍລິການພຣີ, ຮັກສາຄວາມລັບໃຫ້ທ່ານ ແລະເປີດໄວ້ສອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ມັນຈະບອກບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໄປຫາໄດ້ເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.



ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: **World Wide Web** <http://opr.princeton.edu/ec/>

### ການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ



# ຍັງບໍ່ສາຍເກີນໄປ ທີ່ທ່ານຈະປ້ອງກັນ ການຕັ້ງທ້ອງ



*path*  
PATH ແມ່ນອົງການມາຈຽຊາທີ່ໄຫວ້ງິນກຳໄລທີ່ມີສາມາດສ້າງການໃຫຍ່ຢູ່ເນື່ອງຂຶ້ນເອເຕີລັດຕ໌ຊຶງຕັນ. ຫນ້າທີ່ຂອງ PATH ແມ່ນເພື່ອບໍ່ຢູ່ງສຸຂະພາບ, ໄດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍອາຈຽງທຶນຂອງ John Merck Fund: ມູນນິທິ Horizons Foundation; ແລະອົງການສາທາລະນະສຸກສະຫະຣັດ, ເຂດ 10 ແລະ ມູນນິທິຂອງ Henry J. Kaiser Family Foundation.

## ທ່ານຢ້ານກົວວ່າທ່ານຈະຕັ້ງຫ້ອງບໍ່?

ຈົ່ງໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມຖ້າຫາກທ່ານຮ່ວມເພດພາຍ

- ໃນ 3 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ເລຂະ:
- ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີໃດຄຸມກຳເນີດ
- ຖ້ອນນາໄມສິກຂາດຂະນະຮ່ວມເພດ
- ທ່ານລຳຊ້າໃນການສຶດຢາຄຸມກຳເນີດ
- ທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສອງວັນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຫຼືວ່າທ່ານເລີ້ມກິນຢາລຳຊ້າ
- ທ່ານຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮ່ວມເພດ

ການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມເປັນວິທີນຶ່ງທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຫ້ອງຫຼັງຈາກການຮ່ວມເພດ. ມີສອງວິທີໃນການຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີມ:

1. ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມ (ຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ECPs ຫຼືຢາທີ່ກິນໃນຕອນເຊົ້າຫຼືງວັນທີ່ຮ່ວມເພດ (Morning After Pills)) ທີ່ໃຊ້ພາຍໃນ 3 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ຮ່ວມເພດ, ຫຼື
  2. IUD (intrauterine device) ໃຊ້ສອດເຂົ້າໃນມິດຈຸກ 5 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ຮ່ວມເພດ.
- ຖານທ່ານໝໍຂອງທ່ານສຳລັບລາຍລະອຽດ.

**ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມແມ່ນຫຍັງ (ECPs)?**  
ECPs ແມ່ນຢາຄຸມກຳເນີດທຳມະດາຂະນິດນຶ່ງ. ຢານີ້ເປັນຢາທີ່ທ່ານຕ້ອງກິນຕາມກຳນົດເສດ ພາຍໃນ 3 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຮ່ວມເພດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງຫ້ອງ. ຢານີ້ສາມາດຫຼີດຜ່ອນໄອກາດໃນການຕັ້ງຫ້ອງໄດ້ປະມານ 75%.



**ຢ່າລໍຊ້າ!**  
ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນການຖືພາ, ທ່ານຈະຕ້ອງກິນຢາເມັດຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມພາຍໃນ 3 ວັນ (ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດ.

**ECPs ທຳໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?**  
ECPs ປ້ອງກັນການຕັ້ງຫ້ອງໄດ້ໂດຍ:

- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄຂ່ໄຂ້ຢ່າງຊິວຄາວ, ຫຼື
- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຂ່ໄຂ້ປະສົມພັນ, ຫຼື
- ປ້ອງກັນໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຕາະຢູ່ໃນມິດຈຸກ

ECPs ຈະບໍ່ສາມາດທຳໜ້າທີ່ໄດ້ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງຫ້ອງແລ້ວ.  
ECPs ບໍ່ແມ່ນຢາທີ່ໃຊ້ທຳແຫ້ງ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ໃຫ້ໂທຮຫາສາຍໂທຣດ່ວນການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີມ. ພຣີ, ເກັບເປັນຄວາມລັບຕາລອດທັງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້

**1 - 8 8 8 8 - 6 6 8 - 2 5 2 8**

## ຢານີ້ປອດໄພຫຼືບໍ່?

ກົນອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະຣັດອະວະນິກາໄດ້ແຈ້ງວ່າ ECP ເປັນຢາທີ່ປອດໄພ. ຢານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄອກາດໃນການຕັ້ງຫ້ອງໄດ້ສູງຫຼັງຈາກການຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປ້ອງກັນ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຢືກສາກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງວ່າມີເຫດຜົນອັນໃດຫຼືບໍ່ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຄວນໃຊ້ ECPs ໄດ້.

## ຢານີ້ທຳໃຫ້ມີອາການແພ້ຫຼືບໍ່?

ຜູ້ຍິງບາງຄົນທີ່ກິນຢາ ECPs ມີອາການຜຸ່ນຫັ່ງຫຼືຮາກ. ຜູ້ຍິງ ບາງຄົນມີອາການເຈັບນິ້ຫຼືປວດຫົວ. ອາການແພ້ນີ້ຈະມີຢູ່ປະມານນຶ່ງວັນ. ECPs ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຫຼືຊ້າກວ່າປົກກະຕິໄດ້.

