

# ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគហើមថ្លើម តើអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែដឹង

## តើអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែដឹង

### ១ តើហេតុអ្វីបានជា ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ?

រោគហើមថ្លើម ភេទប្តី ជាជំងឺដ៏ធ្ងន់មួយ។  
 រោគហើមថ្លើម ភេទប្តី វិរុស មានរយះខ្លី (ឈឺធ្ងន់) អាចនាំឲ្យ :

- ធ្វើមិនឲ្យឃ្លាន
- រាគ និង ក្អក
- មានភាពហត់
- យ៉ោនដីស (រោគរលៀងស្បែកឬភ្នែក)
- ឈឺចុកក្នុងសាច់ដុំ ក្នុងសន្ធាក់ និងក្នុងពោះ

វាអាចមានរយះយូរដែរ (ឈឺរ៉ាំរ៉ៃ) ការឈឺនេះអាចនាំឲ្យ :

- ធ្វើឲ្យថ្លើមខ្លួនខ្ចី (រោគថ្លើម)
- រោគមហារីកថ្លើម
- ស្លាប់

មនុស្ស ប្រហែល ១.២៥ លានអ្នកក្នុងរោគថ្លើមប្តីរ៉ាំរ៉ៃនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្នុងមួយឆ្នាំៗគេអាចទាយថា :

- មានមនុស្ស ៨០,០០០អ្នក ភាគច្រើនគឺក្មេងទើបតែពេញវ័យ ក្នុងរោគថ្លើមនេះ។
- មនុស្សច្រើនជាង១១,០០០អ្នកគេងក្នុងពេលដោយរោគថ្លើមនេះ។
- ហើយមនុស្ស ៤,០០០ទៅ៥,០០០ ស្លាប់ដោយរោគថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃនេះ។

ថ្នាំបង្ការរោគថ្លើម ភេទប្តីនេះ វាអាចការពារកុំឲ្យមានរោគថ្លើម ប្តី។ វាគឺជាថ្នាំបង្ការរោគមហារីកពិមុនដូច្នោះ ហើយវាក៏អាចបង្ការរោគមហារីកថ្លើមដែរ។

### ២ តើរោគថ្លើមភេទប្តី វិរុសនេះ ឆ្លងរបៀបណាដែរ?

រោគថ្លើមប្តីនេះឆ្លងតាមការប៉ះឈាមឬទឹកក្នុងខ្លួនពីមនុស្សដែលមានរោគ នេះ។  
 យើងអាចឆ្លងតាមមនុស្សដែលមានរោគនេះ យ៉ាងច្រើនរបៀបដូចជា :

- គេងជាមួយមនុស្សដែលមានរោគនេះ ដោយគ្មានប្រើម៉ូមិកការពារមុន
- ប្រើម្ជុលចាក់ថ្នាំជាមួយមនុស្សដែលចាក់ថ្នាំខុសច្បាប់
- មុតម្ជុលដែលដាច់នៅកន្លែងធ្វើការ
- ពេលសំរាលកូនចេញពីម្តាយដែលមានរោគនេះ

ប្រហែលមាន ១ ក្នុងមនុស្ស ៣ អ្នកចង់ដឹងថា តើ ឆ្លងរោគថ្លើមប្តីនេះដោយរបៀបណាទេ។

### ៣ នរណាដែលគួរចាក់ថ្នាំការពាររោគថ្លើមប្តីនេះ ហើយពេលណា?

- គ្រប់ក្មេងដែលមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ
- ក្មេង ដែលមានអាយុលើសពី ១៥ ឆ្នាំ ហើយដឹងថាមានរោគនេះ។

ក្មេងទើបតែពេញវ័យហើយដឹងថាមានរោគនេះ :

- មនុស្សដែលដើររួមដំណេក ច្រើនជាងមនុស្សម្នាក់ ក្នុង ៦ ខែ
- មនុស្សប្រុសដែលដើររួមដំណេកជាមួយមនុស្សប្រុស
- រួមដំណេកជាមនុស្សដែលកើតរោគនេះ
- មនុស្សដែលចាក់ថ្នាំខុសច្បាប់
- ធ្វើការនៅកន្លែងថែរក្សារសុខភាព ឬកន្លែងការពារសន្តិសុខដែលមានមនុស្សនាំមករោគនេះ តាមឈាម ឬទឹកនៅក្នុងខ្លួន។
- ប៉ះមនុស្សដែលមានរោគថ្លើមប្តីនេះ ពេលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយ។
- ជាមួយអ្នកជម្ងឺដែលទៅលាងឈាមរាល់ដង

បើអ្នកមិនដឹងច្បាស់ទេ កុំហ៊ានប្រថុយ សូមសួរដុកទ័រ ឬអាំងហ្វិច្យែរ។

✓ មនុស្សទាំងអស់ត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ ឲ្យបានចំងាយតាមការណែនាំ  
 បើអ្នកដឹងថាអ្នកភ្លេចចាក់ថ្នាំ ឬដឹងថាវាហួសពេល ត្រូវទៅចាក់វាភ្លាម។  
 មិនចាំបាច់ទៅចាក់សារឡើងវិញទេ។

តារាងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគថ្លើមប្តី	តើនរណា?		
	ចំពោះទារកដែលម្តាយមានរោគថ្លើមប្តីនេះ	ចំពោះទារកដែលម្តាយគ្មានរោគថ្លើមប្តីនេះ	ចំពោះក្មេងអាយុច្រើន ក្មេងជំងឺ ឬ ក្មេងពេញវ័យ
តើហេតុអ្វី?	នៅក្នុង ១២ ម៉ោងពេលកើតរួច	ពេលកើតរួចបានពីខែ	ពេលណាក៏បាន
ថ្នាំចាក់លើកទីមួយ	នៅក្នុង ១២ ម៉ោងពេលកើតរួច	ពេលកើតរួចបានពីខែ	ពេលណាក៏បាន
ថ្នាំចាក់ការពារទីពីរ	ពី អាយុ១ខែទៅ ២ខែ	ពី អាយុ១ខែទៅ៤ខែ (ចាំយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន ១ខែ)	ពី ១ខែទៅ២ខែ បន្ទាប់ពីទីមួយ
ថ្នាំចាក់ការពារទីបី	ពីអាយុ ៦ខែ	ពីអាយុ ៦ខែ ទៅ១៥ខែ	ពី ៤ខែទៅ៦ខែ បន្ទាប់ពីទីមួយ

- ថ្នាំចាក់ការពារទីពីរ ចាំយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន ១ខែ បន្ទាប់ពីទីមួយរួច។
- ថ្នាំចាក់ការពារទីបី ចាំយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន ពីរខែ បន្ទាប់ពីទីពីររួច ហើយចាំយ៉ាងតិចឲ្យបាន៤ខែបន្ទាប់ថ្នាំចាក់ទីមួយរួច។
- ថ្នាំទីបីមិនអាចចាក់បង្ការឲ្យទារកក្រោមអាយុ ៦ខែទេ ពីព្រោះវាមានភាពអន់ថយពេលទៅមុខយូរទៀត។

ក្មេងជំងឺ ដែលមានអាយុ ១១ ទៅ ១៥ឆ្នាំ អាចចាក់បង្ការរោគថ្លើមប្តីដង ប៉ុណ្ណោះទេ។ វាបំបែកចេញពីគ្នាពី ៤-៦ខែ។ សូមអ្នកថែរក្សារសុខភាពអ្នកចង់ដឹងសព្វគ្រប់។

ថ្នាំបង្ការរោគភេទប្តីនេះអាចចាក់ក្នុងពេលជាមួយថ្នាំបង្ការរោគផ្សេងទៀត។

**៤ ចំពោះមនុស្សខ្លះមិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគថ្លើមថ្មីទេ គួរតែរង់ចាំ**

ចំពោះមនុស្សខ្លះមិនគួរ ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគថ្លើមថ្មី ទេ បើសិនជាបើកទិសដោយសារការធ្វើទុក្ខ ពីមេដុត (មេ ថ្មីរាងដែលយកមកធ្វើបំប៉ន) ឬការធ្វើទុក្ខដោយសារ ការចាក់បង្ការរោគថ្លើមទេទុំ ពីមុនមក។

ចំពោះមនុស្សដែល ឈឺបន្តិចបន្តួច ឬ ខ្លាំងនៅពេលដល់ថ្ងៃចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគ តាមធម្មតាគេត្រូវ តែរង់ចាំរហូតទាល់ ជាសិន។



សូមសួរអ្នកមើលថែរក្សា ឬអាំងហ្វិមេញ បើចង់ដឹងដំណឹងផ្សេងៗទៀត។

**៥ បើចាក់ថ្នាំបង្ការរោគថ្លើមថ្មី តើអាចមាន គ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើង?**

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្នាំចាក់ការពារ ក៏វាអាចមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរ ដូចជា ការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនយើងដែលមិនអាចទទួលបាន។ មនុស្សភាគតិច ណាស់ ដែលអាច មានឈឺ ឬ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ ក្នុងការចាក់បង្ការ រោគថ្លើមនេះ។

ចាក់បង្ការរោគថ្លើមថ្មីនេះមុន ក៏វាគ្រាប់បែកជាទុកឲ្យរោគថ្លើមថ្មី ដែរ។

មនុស្សជាច្រើនដែលបានចាក់បង្ការរោគ មិនដែលមានបញ្ហាអំពីរោគថ្លើមថ្មីនេះទេ។

- អាចមានបញ្ហាតិចដែរ**
- ឈឺនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ ពីមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃដែរ (គឺមានក្មេង ១ឈឺក្នុងក្មេង១១អ្នក បើក្មេងទើបតែពេញវ័យមាន ១ឈឺក្នុង៤ អ្នក)
  - អាចមានរោគគ្រុណក្តៅពីតិចទៅខ្លាំងល្មមដែរ (មានក្មេង ១ឈឺក្នុងក្មេង១៤អ្នក ចំពោះក្មេងទើបនឹងពេញវ័យមាន ១ក្នុង១០០អ្នក)

**បញ្ហាដ៏ធ្ងន់**

- ការទាស់ ឬការប្រែប្រួលខ្លាំង (គឺរាកម្រមាន)

**៦ តើអ្វីទៅ ដែលអាចធ្វើដំណើរប្រែប្រួលខ្លាំង ឬ តិចនៅក្នុងខ្លួន?**

តើខ្ញុំត្រូវកត់សំគាល់អ្វី?

លក្ខណៈខ្លះ ដែលមិនធម្មតាហើយមាន ការប្រែប្រួលខ្លាំង ដូចជាក្រិនក្តៅខ្លាំង ឬ

ចរិកមិនធម្មតា។ វាក្រមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ពេលចាក់ថ្នាំរួច។ បើសិនជាមាន វារីនកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ពីពីរនាទី ទៅពីរបីម៉ោង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំរួច។ វាស្ងួតញាដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ស្លុក ដកដង្ហើមស្រពក្រក្រក ស្លាំង ខ្សោយ បេះដូងដើរលឿន វិលមុខ។ បើប្រសិនជាមានគ្រុនក្តៅ ឬ រោគប្រកាច់ វាត្រូវតែកើតឡើង នៅក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។

**តើខ្ញុំនឹងធ្វើដូចម្តេច?**

- ទូរស័ព្ទទៅអ្នកទំរ ឬ ពន្យារណាជូនទៅអ្នកទំរភ្លាមៗ។
- ប្រាប់អ្នកទំរ អ្វីដែលប្រែប្រួល ថ្ងៃណា ពេលណាដែលកើតបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។
- សុំស្នើអ្នកទំរ អាំងហ្វិមេញ ឬកន្លែងថែរក្សារោគសាស្ត្រ កត់ទុកក្នុងបញ្ជី រាយការណ៍នូវពេលចាក់ថ្នាំការពារមានការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនហៅថា (វិអេសអេស) ឬ ទូរស័ព្ទលេខ ១-៨០០-៨២២-៧៩៧។

**៧ ការចាក់ថ្នាំការពាររហូស គឺសំរាប់ជាតិ ហើយគេមានវិធីការសងវិញ**

អ្នកក្រមានព្រឹត្តិការណ៍ ឬ បើក្រមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ពេលចាក់ ថ្នាំការពាររហូស វិធីខាងសហព័ន្ធនឹងជួយចេញប្រាក់ទៅអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

បើចង់ដឹងដំណឹងសព្វគ្រប់ទៀត ពីរឿងការសង ត្រាយពីការចាក់ថ្នាំការពារ រហូស សំរាប់ជាតិរួច សូមទូរស័ព្ទ ១-៨០០-៣៣៨-២៣៨២ ឬ ឆែក វិបសៃ <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/>

**៨ តើខ្ញុំអាចរៀនថែមទៀតតាមរបៀបណា?**

- សួរកន្លែងអ្នកទៅមើលថែរក្សារសុខភាព។ គេអាចឲ្យបញ្ជីមើលពីលទ្ធផលពីចាក់ ថ្នាំការពារ ហើយដំណឹងផ្សេងៗ ហើយនិងកន្លែងរបស់វា។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងថែរក្សារសុខភាពសំរាប់ធ្វើឲ្យសាំងរោគ របស់រដ្ឋ ដែលនៅ ជិតផ្ទះអ្នក។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងការពារ និងបញ្ជប់កុំឲ្យមានរោគ ហៅថា (ស៊ីឌីស៊ី)
  - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
  - ឆែកមើល វិបសៃ ខាងវិធីធ្វើឲ្យសាំងនឹងរោគ <http://www.cdc.gov/nip> ឬចែកមើលថ្ងៃខាង ស៊ីឌីស៊ីពេកធ្វើមដែលមានវីរុសនៅ វិបសៃឬទំព័រ <http://www.cdc.gov/hepatitis>

