



៥

**បើចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេភី តើអាចមាន គ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើង?**

បើមាន រោគខាន់ស្លាក់ រោគគេតណូស រោគក្អកមាន់ហើយ វាអាចមាន គ្រោះថ្នាក់ផង ចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេភី ទៀត។

តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្នាំចាក់ការពារ ក៏អាចមានបញ្ហា ខ្លាំងខ្លះដែរ ដូចជា ការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចទទួលបាន។ មនុស្សភាគតិច ណាស់ដែលអាចមានឈឺ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ បើចាក់បង្ការ។

**បញ្ហាតិចៗដែលអាចកើតឡើង (ជានិច្ច)**

- គ្រុនក្តៅ (ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ៤ អ្នក)
- ក្រហម ឬ ហើមនៅ កន្លែងចាក់ថ្នាំ(ចំពោះក្មេង ប្រហែលមាន ១ ក្នុង ក្មេង ៤ អ្នក)
- ឈឺចុក ដែលឆាប់ឈឺ នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ (ចំពោះក្មេង ប្រហែលមាន ១ ក្នុង ក្មេង ៤ អ្នក)

បញ្ហាភ្នែកនេះតែងតែកើតឡើង នៅពេល ចាក់ថ្នាំនៅលើកទី ៤ និង ទី ៥ បន្ទាប់ពី ចាក់ ឌីផិអេភី ពីមុនៗមក។ ជួនកាល ចាក់ថ្នាំនៅលើកទី ៤ និង ទី ៥ វាអាចធ្វើឲ្យហើមពេញដៃ ឬ ជើង នៅកន្លែងចាក់ហ្នឹង ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ ៧ ថ្ងៃ (ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៣០ អ្នក)។

**បញ្ហាតិចៗដែលអាចកើតឡើងផ្សេងៗទៀត ដូចជា :**

- មូម៉ៅច្រើន(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៣ អ្នក)
- ហត់ ឬ ញ៉ាំងអស់បាន(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ១០ អ្នក)
- ក្អក(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៥០ អ្នក)

បញ្ហាភ្នែកនេះ តាមធម្មតាកើតឡើង ពេលបានចាក់ថ្នាំ ពី ១-៣ ថ្ងៃ រួច។

**បញ្ហាឈឺឈាមដែរ (មិនទូរទៅ)**

- ប្រកាច់(ញាក់ ឬ ចាប់ផ្តើម)(ប្រហែល មានក្មេង ១ ក្នុង ក្មេង ១៤,០០០អ្នក)
- យំ មិន ចេះបាត់ អស់រយៈពេល ពី ៣ ម៉ោងឡើងទៅ (ប្រហែល មាន ក្មេង ១ ក្នុងក្មេង ១,០០០ អ្នក)
- គ្រុនក្តៅខ្លាំង លើសពី ១០៥° (ប្រហែលមានក្មេង ១ ក្នុងក្មេង ១៦,០០០ អ្នក)

**បញ្ហាខ្លាំងមែនទែន (តែកម្រមាន)**

- គឺមានការទាស់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំយ៉ាងខ្លាំង (មានតិចជាង ១ ក្នុង មួយលានអ្នក)
- មានបញ្ហាជាច្រើន ដ៏ខ្លាំងទៀតកើតឡើង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេភី រួចដូចជា :
  - ប្រកាច់ យ៉ាងយូរ ដំណើរភ្នែក ឬ ដឹងខ្លួនតិច។
  - ខ្លួនក្បាលខូចខ្ទេចខ្ទីរហួត

ពួកនេះវាក្រុមមានកើតឡើងហើយ ពិបាកនិយាយថាវាកើតឡើងមក ដោយសារការចាក់ថ្នាំការពារនោះ ឬយ៉ាងណាទេ។

ការពារកុំឲ្យមានគ្រុនក្តៅ គឺវាសំខាន់ណាស់ចំពោះក្មេងដែលមានជម្ងឺរោគប្រកាច់ ឬសំរាប់រៀនអ្វីក៏ដោយ។ ហើយវាសំខាន់ណាស់បើដឹងក្រុមគ្រួសារណាមាន រោគប្រកាច់។ យើងអាចបន្ថយកុំឲ្យមានគ្រុនក្តៅដោយឲ្យថ្នាំ អាស៊ីរីន-ហ្វូលី ជួយដោះស្រាយខ្លះពេលដែលបានចាក់ថ្នាំរួច ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ សូមមើលក្រុមដានដែលគេឲ្យ មួយសំណុំដើម្បីបង្កាត់បង្រៀនដូចតទៅ។

៦

**តើអ្វីទៅ ដែលអាចធ្វើដំណើរប្រែប្រួលខ្លាំង ឬ តិចនៅក្នុងខ្លួន?**

**តើខ្ញុំត្រូវកត់សំគាល់អ្វី?**

លក្ខណៈខ្លះ ដែលមិនធម្មតាហើយមាន ការប្រែប្រួលខ្លាំង ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬ ចរិតមិនធម្មតា។ វាក្រុមមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ពេលចាក់ថ្នាំរួច។ បើសិនជាមាន វានឹងកើតឡើងក្នុងរយៈ ពេល ពីព្រឹកទៅ ទេព្រឹកម៉ោង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំរួច។ វាឲ្យសញ្ញាដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ស្លក់ ដកដង្ហើមសួរត្រេតត្រេត ស្ទឹង ខ្សោយ បេះដូងដើរលឿន វិលមុខ។ បើប្រសិនជាមានគ្រុនក្តៅ ឬ រោគប្រកាច់ វាត្រូវតែកើតឡើង នៅក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។

**តើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែម?**

- ទូរស័ព្ទទៅអ្នកទំរ ឬ ឲ្យនរណាជូនទៅអ្នកទំរភ្លាមៗ។
- ប្រាប់អ្នកទំរ អ្វីដែលប្រែប្រួល ថ្ងៃណា ពេលណាដែលកើតបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។
- សុំស្នើអ្នកទំរ រាំងហ្វឹមញ្ជោរ ឬកន្លែងថែរក្សារោគសាស្ត្រ កត់ទុកក្នុងបញ្ជី រាយការណ៍នូវពេលចាក់ថ្នាំការពារមានការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនហៅថា(វីអេមីអេស) ឬ ទូរស័ព្ទ ១-៨០០-៨២២-៧៩៦៧។

៧

**ការចាក់ថ្នាំការពាររបួស ប្រជាជាតិ ហើយគេមានវិធីការសងវិញ**

អ្នកកុម្មារមានព្រឹត្តិការណ៍ ឬ បើកូនអ្នកមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពេលចាក់ ថ្នាំការពាររួច វិធីខាងសហគ្រាសនឹងជួយចេញប្រាក់ទៅអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

បើចង់ដឹងដំណឹងសព្វគ្រប់ទៀត ពីរឿងការសង ក្រោយពីការចាក់ថ្នាំការពារ របួសប្រជាជាតិ សូមទូរស័ព្ទ ១-៨០០-៣៣៨-២៣៨២ ឬ ប្រើ វិបសៃ <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/>

៨

**តើខ្ញុំអាចរៀនថែមទៀតតាមរបៀបណា?**

- សួរកន្លែងអ្នកទៅមើលថែរក្សារសុខភាព។ គេអាចឲ្យបញ្ជីមើលពីលទ្ធផលពីចាក់ ថ្នាំការពារ ហើយដំណឹងផ្សេងៗ ហើយនិងកន្លែងរបស់វា។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងថែរក្សារសុខភាពសំរាប់ធ្វើឲ្យសាំងរោគ របស់រដ្ឋ ដែលនៅ ជិតផ្ទះអ្នក។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងការពារ និងបញ្ជប់កុំឲ្យមានរោគ ហៅថា (ស៊ីឌីស៊ី)
  - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
  - ផែកមើល វិបសៃ ខាងវិធីធ្វើឲ្យសាំងនិងរោគ <http://www.cdc.gov/nip>

