

ວັກຊີນປ້ອງກັນ ບາດພະຍັກ ແລະ ໂຮກຄໍຕິບ (Td)

ກຽມກັບເຊື້ອໂຮກຕ່າງໆ

ບາດພະຍັກ (ລອກຈໍ) ແລະໂຮກຄໍຕິບ ຖືວ່າ ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ບາດພະຍັກ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ດ້ວຍການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອໂຮກ ເຂົ້າ ໄປສູ່ຮ່າງກາຍໂດຍທາງປາກບາດ ຫລື

ຕາມບາດແຜ, ໂຮກຄໍຕິບແຜ່ຜ່າຍອອກໄປໄດ້ ຈາກຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກໄປສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍທາງ ດັງແລະທາງປາກ.

<p>ບາດພະຍັກເຮັດໃຫ້ເກີດ: ເຈັບປວດກະຕຸ້ນ ຕາມກ້າມເນື້ອທົ່ວໄປ</p> <p>ມັນສາມາດນຳໄປສູ່: - ຄາງກະໄຕ "ແຂງ" ແລ້ວເຮັດ ໃຫ້ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດອຳປາກ ຫລືບໍ່ສາມາດກິນໄດ້ - ຕາຍ</p>	<p>ໂຮກຄໍຕິບເຮັດໃຫ້ເກີດ: ອາການຕັນດັງ, ຫັນໃຈຝືດໃນຮູຄໍ, ຫລື ຫລອດລົມບໍ່ສະດວກ</p> <p>ມັນສາມາດນຳໄປສູ່: - ການຫາຍໃຈບາກ - ຫົວໃຈບໍ່ທ່ຽງນ - ອຳມະພາດ - ຕາຍ</p>
---	--

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້ຈັກ
ກ່ອນທີ່ທ່ານ ຫລື
ເດັກຂອງທ່ານຈະສັກ
ວັກຊີນ



ກຽມກັບວັກຊີນຕ່າງໆ

ສົມປະໂຍດຕ່າງໆຂອງວັກຊີນ

ການສັກວັກຊີນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕໍ່ການປ້ອງກັນຕໍ່ສັກບາດພະຍັກ ແລະ ໂຮກຄໍຕິບ ຍ້ອນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ມັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີກໍລະນີດັງກ່າວນີ້ມີນ້ອຍລົງ. ກໍລະນີດັງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນນ້ອຍທີ່ສຸດກັບພວກ ເດັກໆ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫລາຍສັກວັກ ຊີນສຳລັບ DTP (ໂຮກຄໍຕິບ, ບາດພະຍັກ, ແລະໄອຫິດ), DTaP (ໂຮກຄໍຕິບ, ບາດພະ ຍັກ, ແລະໄອຫິດ ແບບອາການຫນັກ), ຫລື DT (ໂຮກຄໍຕິບ ແລະບາດພະຍັກ). ມັນຈະມີ ກໍລະນີດັງກ່າວ ນີ້ເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ຖ້າພວກ ເຮົາຫຍຸດການ ສັກວັກຊີນ.

ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຄວນສັກວັກຊີນສຳລັບ Td?

ວັກຊີນ Td ຜລິດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ສຳລັບຄົນຜູ້ ທີ່ມີອາຍຸ 7 ປີ ຫລືແກ່ກວ່າ.

ຄົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັ້ງ ຊຶ່ງເປັນວັກຊີນອື່ນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນວັກຊີນ ປ້ອງກັນບາດພະຍັກ ແລະໂຮກຄໍຕິບ (DTP, DTaP, ຫລື DT) ໃນຊ່ວງໄລຍະຊີວິດຂອງເຂົາ ເຈົ້ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຄວນສັກວັກຊີນສຳລັບ Td. ຫລັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັກວັກຊີນເທື່ອທີ ສາມແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງການສັກວັກຊີນ Td ທຸກໆໄລຍະ 10 ປີ ໃນຕອດຊີວິດ.

ວັກຊີນສຳລັບປ້ອງກັນເຊື້ອໂຮກອື່ນໆ ກໍອາດ ຈະໄດ້ສັກໃຫ້ພ້ອມດຽວກັນ ກັບການສັກວັກ ຊີນສຳລັບ Td.

ໃຫ້ບອກທ່ານຫມໍຫລື ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານ ຂອງທ່ານຊາບ ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນ:

- ເຄີຍເບື້ອ ຫລືແພ້ຍາຢາງຫນັກມາກອ່ນ ຫລືເຄີຍມີບັນຫາກຽມກັບວັກຊີນ Td, ຫລື ວັກຊີນອື່ນໆທີ່ເປັນວັກຊີນສຳລັບປ້ອງກັນ ບາດພະຍັກ ແລະໂຮກຄໍຕິບ (DTP, DTaP, ຫລື DT)
- ປັດຈຸບັນນີ້ ມີອາການເຈັບປວຍພໍປານກາງ ຫລືເຈັບປວຍຫນັກ
- ຖືພາ

ຖ້າທ່ານບໍ່ແນໃຈ, ໃຫ້ຕາມທ່ານຫມໍ ຫລື ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານຂອງທ່ານ.

ແມ່ນຫຍັງຄືການສູ່ງຈາກການສັກ ວັກຊີນ Td?

ກັບຢາຊິນິດໃດກໍຕາມ, ມັນຈະມີການສູ່ງຕໍ່ ການທີ່ຈະມີບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນນ້ອຍທີ່ສຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າການຕາຍ ກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຫລັງຈາກສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ.

ການສູ່ງຈາກການສັກວັກຊີນນັ້ນ ແມ່ນວ່າມີ ນ້ອຍກວ່າການສູ່ງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆຫລາຍທີ່ ສຸດ ຖ້າຫາກຄົນເຮົາຫຍຸດໃຊ້ວັກຊີນ.

ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນ Td ເກືອບຫມົດທຸກຄົນບໍ່ມີບັນ ຫາຈາກການສັກວັກຊີນນີ້.



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Public Health Service
Centers for Disease Control
and Prevention

ບັນຫາເບົາ

ຖ້າວ່າມີບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນ ມັນມັກເລີ່ມເປັນພາຍໃນຫລາຍໆ ຊົ່ວໂມງໃນມື້ໆ ຫລືສອງມື້ ຫລັງຈາກການສັກວັກຊີນແລ້ວ. ມັນອາດ ຈະເປັນຢູ່ດົນເຖິງ 4-6 ມື້:

- ເຈັບປວດ, ແດງທຶນ, ຫລືເປັນບວມຢູ່ບ່ອນທີ່ສັກວັກຊີນນັ້ນ

ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເປັນແຮງກັບຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ມັກສັກວັກຊີນ ເລື້ອຍໆ.

ເພື່ອບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດນັ້ນ ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ຢາ ເອຊີຕາມິໂນເຟນ ຫລືອີບູໂປຣຟິນ (ບໍ່ມີ-ແອສເປຣິນປະສົມ) ແກ້.

ບັນຫາຫນັກ

ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນຫນ້ອຍເທື່ອທີ່ສຸດ:

- ການແພ້ຢາຢ່າງຫນັກ
- ເຈັບສູບ, ກ້າມກົກແຂນເສັ້ນຫາຍ. ກໍ່ອະນິດັ່ງກ່າວນີ້ເລີ່ມເປັນ ພາຍໃນ 6 ວັນ ຫາ 6 ອາທິດ ຫລັງຈາກການສັກວັກຊີນ ແລະກໍ ອາດຈະເປັນຢູ່ນານຫລາຍເດືອນ.

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫາກວ່າມີອາການແພ້ຢາເກີດຂຶ້ນ:

- ☞ ໂທຫາທ່ານຫມໍ ຫລືເອົາຜູ້ກ່ຽວໄປພົບທ່ານຫມໍໂດຍຕ່ວນ.
- ☞ ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງວັນທີແລະເວລາ ທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນນັ້ນໄວ້.
- ☞ ຖາມທ່ານຫມໍ, ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານ, ຫລືກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກເພື່ອແຈ້ງເຫດການອັນຕວລາຍຂອງວັກຊີນ (Vaccine Adverse Report) ຫລືໂທ: (800) 822-7967 (ເລກໂທພຣີ)

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສັກວັກຊີນ ແຫ່ງຊາດ (National Vaccine Injury Compensation Program) ໃຫ້ການຊົດເຊີຍ (ການຈ່າຍ) ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຖືກ ສາທັດໂດຍການສັກວັກຊີນ. ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ໂທໄປຍັງ: (800) 339-2382 (ເລກໂທພຣີ)

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກນັ້ນໃຫ້ຖາມທ່ານຫມໍ ຫລືຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເອົາ ລາຍລະອຽດທັງຫມົດກ່ຽວກັບວັກຊີນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫລືສາມາດທີ່ ຈະສເນີແນະແຫລ່ງລາຍລະອຽດໃຫ້.

