

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនចាក់បង្ការរោគ

កញ្ជីល, ក្រឡាទែន និង ស្នូច

អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការដឹង

1 ហេតុអ្វីបានជាចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ?

រោគកញ្ជីល, រោគក្រឡាទែន និងរោគស្នូច គឺជារោគធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ កញ្ជីល

- មេរោគកញ្ជីលធ្វើឲ្យឡើងរាងឈើស្បែក, ពួក, ហ្សេរសំបោរ, ក្រហាយភ្នែក ហើយនិងគ្រុន។
- វាអាចនាំអោយមានដំបៅត្រចៀក, ជម្ងឺរលាកសួត, ប្រកាច់ (ភ្នែក ឬ បើកភ្នែកឆ្ងសម្អាតស្រីស្បែក) ខូចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល ហើយអាចស្លាប់បាន។

ក្រឡាទែន

- មេរោគក្រឡាទែនធ្វើឲ្យគ្រុន, ឈឺក្បាល ហើយនិងហើមក្រពិញនៅខាងក្រោមគ្នាម។
- វាអាចនាំអោយឆ្លង, ជម្ងឺរលាកស្រាមខួរ (រោគដំបៅខួរក្បាលនិងសរសៃឈាមឡើង) ហើយឈឺចុកចាប់ពងក្ល ឬយោនី ហើយនិងកម្រស្លាប់។

ស្នូច (រោគកញ្ជីលអាទិ៍ម៉ង់)

- មេរោគស្នូចធ្វើឲ្យឡើងរាងឈើស្បែក, គ្រុនធម្មតា ហើយនិងឈឺចុកចាប់សន្លាក់ក្អែង (រោគច្រើនជាស្រ្តីពេទ)។
- បើសិនជាស្រ្តីមានរោគស្នូចនៅពេលមានផ្ទៃពោះ, ស្រ្តីនោះអាចរលូតកូន ឬពារកអាចកើតមានជម្ងឺជាប់ជាមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

លោកអ្នក ឬកូនលោកអ្នកអាចទទួលបានរោគទាំងអស់នេះដោយនៅជិតស្និតមនុស្ស ដែលមានមេរោគនោះ។ មេរោគនេះ វាសាយហើយឆ្លងមកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្ស ម្នាក់ទៀតតាមខ្យល់។

ថ្នាំចាក់ វ៉ាក់ស៊ីន សំរាប់រោគកញ្ជីល, ក្រឡាទែន និងស្នូច (MMR) អាចការពាររោគទាំងអស់នេះ បាន។

ក្មេងភាគច្រើនដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនការពារ MMR នឹងមិនមានរោគទាំងអស់នេះឡើយ។ វាអាចមានក្មេងច្រើនថែមទៀតមានរោគទាំងអស់នេះ បើសិនជាយើង ឈប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគនេះ។

2 តើអ្នកណាគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR ហើយនៅពេលណា ?

ក្មេងទាំងឡាយគួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR 2 ដង :

- ✓ ចាក់លើកដំបូងនៅពេលមានអាយុ 12-15 ខែ
- ✓ ហើយលើកទីពីរនៅពេលមានអាយុ 4-6 ឆ្នាំ។

ទាំងនេះគឺអាយុគួរចាក់ថ្នាំ។ ប៉ុន្តែ កូនក្មេងអាចទទួលបានថ្នាំលើកទីពីរនៅពេលណាដែល អោយតែបានក្រោយពី 28 ថ្ងៃបានចាក់លើកដំបូងហើយ។

មនុស្សពេញវ័យខ្លះ គួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនការពាររោគ MMR ផងដែរ : ជាទូទៅ មនុស្សមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះ ដែលបានកើតក្រោយឆ្នាំ 1956 គួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនការពាររោគ MMR យ៉ាងហោចបានម្តង, លុះណាតែ បុគ្គលនោះបានបង្ហាញឃើញ ថាបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន ឬមានរោគទាំងឡាយនោះ។ សូមសាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យសំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនការពាររោគ MMR ប្រហែលជាអាចចាក់អោយទឹមគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន ផ្សេងៗទៀតបាន។

3 មនុស្សខ្លះមិនគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR ឬគួររង់ចាំ

- មនុស្សដែលមិនគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR គឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់មាន ប្រតិកម្មទាស់ដល់អាយុជីវិតដល់ជាតិខាប៊ីអន្ទីល, ថ្នាំបដិបក្ខប្រាណ **neomycin**, ឬដល់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ **MMR** ពីមុនមក។
- មនុស្សដែលឈឺមិនធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរមធ្យមនៅពេលកំណត់ចាក់ថ្នាំនោះ គួរតែរង់ចាំរហូតដល់ស្រួលឡើងវិញសិន មុននឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR ។
- ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរតែរង់ចាំមិនទាន់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR រហូតដល់សំរាលកូនរួចហើយសិន។ ស្រ្តីទាំងឡាយគួរតែជៀសវាងមានផ្ទៃពោះបាន 4 អាទិត្យក្រោយពីបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR រួច។
- ចំពោះមនុស្សខ្លះគួរតែទាត់ទងមកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនអំពីការគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន បង្ការរោគ MMR រួមទាំងមនុស្សដែលមាន :
 - រោគ HIV/AIDS ឬក៏មេរោគផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួន
 - កំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលរោគដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួន ដូចជាថ្នាំ **steroids** ធំៗ 2 អាទិត្យ ឬយូរជាងនេះ។
 - មានរោគមហារីកណាមួយ
 - កំពុងតែព្យាបាលរោគមហារីកដោយថែមថែមកម្រិត ឬថ្នាំសង្កូវ
 - ធ្លាប់មានទំនួនកោសិកាតូចៗ (ឈាមវិបល្លាស)
- ចំពោះមនុស្សដែលថ្មីៗនេះមានចាក់បញ្ចូលឈាម ឬបានទទួលឈាមផ្សេងៗ គួរតែសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់គេ នៅពេលណាគេអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគ MMR បាន

សូមសាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យសំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

