

THUỐC CHỨNG SÀI UỐN VÁN VÀ BẠCH HẦU (Td)

Những điều bạn cần biết
trước khi bạn hoặc con
của bạn được chủng



VỀ CÁC CHỨNG BỆNH NÀY

Sài uốn ván (cứng hàm) và bạch hầu là các chứng bệnh hiếm nghèo. Sài uốn ván là do vi trùng xâm nhập cơ thể qua chỗ bị đứt da hoặc vết thương.

Bạch hầu lan truyền khi vi trùng lây từ người bị nhiễm trùng sang mũi hoặc cổ họng những người khác.

Sài uốn ván làm cho:
tất cả các bắp cơ bị giật co
thắt trầm trọng và đau đớn

Bạch hầu gây ra:
một mảng phủ dày trong mũi,
cổ họng, hoặc khí quản

Bệnh này có thể dẫn đến:
- quai hàm bị "khóa cứng"
làm cho bệnh nhân không
thể mở miệng hoặc nuốt
được

Bệnh này có thể dẫn đến:
- các khó khăn về hô hấp
- tim ngưng hoạt động
- tê liệt
- thiệt mạng

VỀ THUỐC CHỨNG

Các lợi điểm của thuốc
chủng

Cho bác sĩ hoặc y tá của bạn
biết nếu người được chủng:

Chủng ngừa là phương cách hay nhất để bảo vệ chống lại sài uốn ván và bạch hầu. Nhờ có chủng ngừa cho nên ngày nay trường hợp mắc phải các chứng bệnh này ít xảy ra hơn nhiều. Trẻ em nay hiếm khi bị mắc các bệnh này vì đa số các em đều được chủng ngừa DTP (Bạch hầu, Sài Uốn Ván, và bệnh Ho Gà), DTaP (Bạch hầu, Sài Uốn Ván, và bệnh Ho Gà vô tế bào), hoặc DT (Bạch Hầu và Sài Uốn Ván). Nếu chúng ta ngưng chủng ngừa cho mọi người thì ắt sẽ thấy nhiều trường hợp mắc phải các chứng bệnh này hơn.

- đã có lần bị phản ứng nghiêm trọng vì dị ứng với thuốc hoặc gặp khó khăn gì khác sau khi được chủng Td, hoặc bất cứ loại thuốc chủng sài uốn ván và bạch hầu nào khác (DTP, DTaP, hoặc DT)
- hiện đang bị bệnh ở mức trung bình hoặc bệnh nặng
- đang mang thai

Nếu bạn không chắc, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Khi nào thì bạn nên chủng
ngừa Td?

Thuốc chủng Td có thể
đưa đến các rủi ro nào?

Thuốc chủng Td được dành cho
những người từ 7 tuổi trở lên.

Như bất cứ loại thuốc men nào,
vẫn có các rủi ro dù thật hiếm
để có thể đưa đến vấn đề
nghiêm trọng, ngay cả chết
người được, sau khi được chủng
ngừa.

Những người nào trong đời chưa
được chủng ít nhất 3 lần về bất
cứ loại nào (DTP, DTaP, hoặc DT)
để ngừa sài uốn ván và bạch
hầu thì nên chủng Td. Sau khi
chủng lần thứ ba, cứ mỗi 10
năm một lần cần phải chủng lại
Td cho đến trọn đời.

Những rủi ro do thuốc chủng
gây ra vẫn hiếm hơn nhiều so
với các rủi ro do các chứng
bệnh này gây ra nếu mọi người
ngưng sử dụng thuốc chủng.

Các loại thuốc chủng khác
cũng có thể được dùng cùng
lúc với Td.

Hầu như tất cả những người
được chủng ngừa Td đều không
gặp vấn đề gì cả.

Các trường hợp khó khăn ở tầm mức nhẹ

Nếu các trường hợp sau đây xảy ra thì thông thường sẽ xảy ra trong vòng vài giờ đến một hoặc hai ngày sau khi được chủng. Các triệu chứng này có thể kéo dài 1-2 ngày:

- nơi được chủng trở nên ê ẩm, tấy đỏ, hoặc sưng lên

Các triệu chứng này có thể nặng hơn ở người lớn chủng ngừa Td thường xuyên quá.

Có thể dùng các loại thuốc Acetaminophen hoặc Ibuprofen (không có chất aspirin) để làm hạ cơn đau nhức.

Các trường hợp khó khăn nghiêm trọng

Những tình trạng này rất hiếm xảy ra:

- bị phản ứng nặng vì dị ứng với thuốc chủng
- đau nhức dữ dội và bắp thịt bị xẹp đi trên (các) bắp tay. Tình trạng này xảy ra từ 2 đến 4 tuần sau khi được chủng, và có thể kéo dài nhiều tháng.

Nên làm gì khi xảy ra phản ứng nghiêm trọng:

- ☒ Gọi bác sĩ hoặc đưa người đó đến bác sĩ ngay lập tức.
- ☒ Ghi lại sự việc cùng ngày giờ xảy ra.
- ☒ Yêu cầu bác sĩ của bạn, y tá, hoặc cơ quan y tế làm Bản Phúc Trình về Trường Hợp Bị Nghịch Thuốc Chủng (Vaccine Adverse Event Report) hoặc gọi điện thoại số:

(800) 822-7967 (miễn phí)

Chương Trình Toàn Quốc về Bồi Thường Thương Tích Vì Thuốc Chủng (National Vaccine Injury Compensation) bồi thường (trả tiền) cho những người được nghĩ là bị thuốc chủng gây phương hại cho họ. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số:

(800) 338-2382 (miễn phí)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nữa, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn. Những người này có thể đưa cho bạn toa trong hộp đựng nói về loại thuốc đó hoặc cho bạn biết những nơi nào để bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết.

