



僅在緊急情況下使用事後避孕丸!

請勿將事後避孕丸用作一般性避孕。它不如一般性避孕法那樣有效。

在平常性交時，請照常使用一般性的避孕法(避孕丸、避孕套、避孕針等)。

事後避孕丸無法保護你避免感染性病及愛滋病等病毒，避孕套是防止性病與愛滋病最有效的方法。

如何獲得事後避孕丸呢?

你可以從家庭醫生、社區診所或衛生所獲取。

打電話告訴他們，你需要事後避孕丸。

如果你不知道去那裏領取，請打以下電話



**事後避孕電話熱線：
1-888-668-2528**

僅有英語和西班牙語服務

這個免費電話會告訴你該往何處領取並為你保密。

你也可以從電腦網路中獲取更多資料。



World Wide Web

<http://opr.princeton.edu/ec/>

Path是一個非營利性的國際組織，總部在華盛頓州的西雅圖市。其使命是要促進健康，特別是婦女和小孩的健康。本組織受到John Merck基金、Horizon基金會、Henry J. Kaiser基金會和美國公共衛生服務X區域的贊助。

事後避孕法



避免懷孕 立即行動

害怕你已懷孕？

如果你在過去三天內發生過性關係，而

- 沒有採用任何避孕措施。
- 避孕套破裂。
- 未及時注射避孕針。
- 連續兩次以上未按時服用避孕丸或當你開始服用時已為時過晚。
- 你曾被強迫性交。

你可嘗試使用事後避孕法。


事後避孕法是在發生性交之後避免懷孕的一種方法，它主要包括兩種方法：

1. 在性交後三天之內使用事後避孕丸（亦稱ECPs或晨後藥丸），或者
2. 在性交後七天之內插入IUD（宮內避孕器）。

請向你的醫師詢問細節。

事後避孕丸是什麼？

事後避孕丸(ECPs)是在性交後三天內服用特別份量以避免受孕的藥丸，這會減低百分之七十五懷孕的機會。



不要等待！

為了避免懷孕，你必須在性交後三天內（即七十二小時內）採取事後避孕法。

事後避孕丸 (ECPs)

如何生效？

事後避孕丸以下列方式有助於避免懷孕：

- 暫時阻止卵子的產生，
- 阻止受精卵著床。

如果已經懷孕，事後避孕丸則無法產生效用。事後避孕丸不是墮胎丸。

詳情請打電話給事後避孕法熱線。

1-888-668-2528

它們安全嗎？

美國食品藥物管理局指出，事後避孕丸是一項安全的選擇，能大大減少沒有避孕的情況下性交而造成懷孕的機會。請向你的醫師查詢你是否有任何理由不能服用該事後避孕丸。

有副作用嗎？

事後避孕丸會使某些婦女腸胃不適或嘔吐，也會使若干婦女乳房疼痛或頭痛。這些副作用只會持續一天左右。事後避孕丸也會使你的經期稍為提前或延後。

