

ECPs 는 위급상황에만 사용하십시오.

ECPs를 일반 피임방법으로 이용하지 마십시오. 이유는 일반 피임방법처럼 효과적이지 못하기 때문입니다. 성관계를 가질 경우에는 일반 피임방법(피임약, 콘돔, 피임주사등)을 사용하십시오. ECPs는 성행위로 감염되는 성병 및 에이즈로부터 귀하를 보호할 수 없습니다. 성병으로 감염되는 성병과 에이즈에 가장 효과적인 예방방법은 콘돔입니다.

ECPs 를 구하는 방법은?

귀하의 주치의나
지역보건소나 보건국 진료소
등을 포함한 각종 의료기관에서
구할 수 있습니다.

전화해서서 응급피임약
(ECPs)이 필요하다고
요청하십시오.

만약 구입장소에 대한
도움이 필요하신 경우
다음 번호로 전화하십시오.

**응급 피임 핫라인:
1-888-668-2528**

안내는 영어와 스페니쉬로만 가능.
이 핫라인은 24시간 가동하고
있으며, 신분을 보장받고
무료로 도움받을 수 있는
장소를 알려 드립니다.
보다 더 상세한 정보를
원하실 경우:

WORLD WIDE WEB
<http://opr.princeton.edu/ec/>



응급 피임법



임신을 방지하기에
아직 늦지
않았습니다.



path
PATH는 위성던주 시애틀에 본부를 두고 국제적으로
운용되고 있는 비영리 단체입니다. PATH는 건강 향상,
특히 여성과 아동들의 보건 향상에 투철을 두고 있습니다.
이 프로젝트는 John Merck 기금, Horizon 재단과
Henry J. Kaiser 가족재단 및 미 공공위생 서비스
X자구의 지원을 받고 있습니다.

임신을 했을까? 두렵습니까?

응급 피임법 사용을 생각해 보십시오.
오. 만약 지난 3일안에 성관계가 있었으며 그리고:
• 아무 피임방법도 사용하지 않았거나
• 콘돔이 찢어졌거나
• 피임주사 맞는 시간을 놓쳤거나
• 연속으로 두 번 이상 피임약 복용을 잊었거나 세 피임약 시작이 늦은 경우

- 강제 추행을 당했을 때
- 응급피임이란 성관계 후 임신을 막지 하는 것으로 두 종류의 응급피임 방법이 있습니다:
응급피임약(ECPS 혹은 모닝 에프터피임약으로 통용됨)은 성관계 후 3일 이내에 사용 하셔야 하고 또는 루프가 이용되며 루프는 성관계 후 5일 이내에 삽입하셔야만 합니다.

자세한 내용은 담당의에게 문의하십시오.

기다리지! 마십시오!

임신을 방지하기 위해서는 성관계 후 3일(72시간)이내에 응급피임약을 복용해야 합니다.

ECPS는 어떻게 작용하나?

ECPS는 다음과 같은 방법으로

임신을 방지합니다:

- 난자생성의 일시적인 중단
- 수정을 일시적으로 방지
- 수정된 난자의 자궁벽 흡착 방지

ECPS는 임신이 된 후에는 효과가

없으며 ECPS는 낙태용 알약이 아닙니다.

자체한 내용을 원하실 경우,
응급피임 찾라인으로 연락
하십시오.
비밀을 보장하고 무료이며
하루 24시간 이용 가능합니다.

ECPS는 무엇인가?

ECPS는 임신방지를 위해 성관계 후 3일이내에 복용하는 강도높은 일반 피임약이며 임신의 가능성을 75퍼센트 가량 감소 시킵니다.

복용시

안전한가?

- 미국 음식물 및 의약품 관리국은 ECPS가 안전하며 피임이 전혀 안된 상태에서의 성관계 후 복용 할 경우 임신의 확률을 크게 감소시킬 수 있음을 발표했습니다.
- 귀하가 ECPS를 사용하는 테 문제가 있는지 주치의나 의료 제공자와 상담하십시오.

복용시 / 부작용이

있나?

- ECPS는 위의 통증, 구토 혹은 유방이 아프거나 두통등을 유발할 수 있으며 이러한 증상들은 대개 하루정도 지속됩니다.
- ECPS는 다음 생리의 시간을 조급 늦추거나 일찍 시작하게 할 수도 있습니다.



1 · 8 8 8 - 6 6 8 - 2 5 2 8