



## ໃບແຈ້ງຂໍ້ມູນ

### ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

#### ໄວລັດໄນລ໌ຕະເວັນຕົກແມ່ນຫຍັງ?

ໄວລັດໄນລ໌ຕະເວັນຕົກ [WNV] ແມ່ນພຍາຍທີ່ອາດຮ້າຍແຮງໄດ້. ຜູ້ຊຸ່ວຊານເຊື່ອວ່າ WNV ກາຍເປັນໂຣຄລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ ໂດຍຈະລຸກລາມຕອນໜ້າຮ້ອນຈົນເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫລົມ. ໃບແຈ້ງຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດສໍາຄັນທີ່ຈະພາໃຫ້ທ່ານສາມາດສັງເກດເຫັນໄວລັດໄນລ໌ຕະເວັນຕົກແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້.

#### ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ WNV ເກີດຂຶ້ນ?

ວິທີຫລັກລ່ຽງ WNV ທີ່ທ່ານຈະພາໃຫ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ.

- ເມື່ອທ່ານຢູ່ນອກອາຄານ ໃຫ້ໃຊ້ຢາໄລ່ແມງຊະນິດ DEET (N, N-diethyl-meta-toluamide). ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາປາກົດເທິງຫໍ້ບັນຈຸ.
- ຍຸງສ່ວນຫລາຍຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຫລາຍທີ່ສຸດໃນຍາມຕົກຄ່ຳແລະຍາມຮຸ່ງ. ຢ່າລີ້ມໃຊ້ຢາໄລ່ແມງ ແລະໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວພ້ອມໂສ້ງຂາຍາວໃນເວລານັ້ນ ຫລືເສື້ອກູ້ໃນອາຄານໃນເວລານັ້ນ. ການນຸ່ງເສື້ອຜ້າສີ່ອ່ອນອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດມອງເຫັນຕົວຍຸງທີ່ລົງມາເຄາະຕົວທ່ານ.
- ຈົງທໍາຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ນັ່ງລວດທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງປະຕູແລະປ່ອງຢ້ຽມຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້.
- ກໍາຈັດບ່ອນທີ່ພວກຍຸງສາມາດຂາຍພັນໄດ້ ໂດຍລະບາຍນ້ຳທີ່ຄ້າງໃນໂຖດອກໄມ້ ຄູ ແລະຖັງໄມ້. ປ່ຽນນ້ຳໃນຈານຂອງສັດລ້ຽງ ແລະໃບແອ່ງອາບນ້ຳຂອງນົກ ອາຫິດລະເທື່ອ. ເຈາະຮູ້ໃນຢາງລົດເກົ່າທີ່ໃຊ້ເປັນໂອ້ນຊາເພື່ອໃຫ້ນ້ຳລະບາຍອອກ. ຖອດນ້ຳອອກຈາກຖັງໝໍ້ນ້ຳຂອງພວກເດັກນ້ອຍແລະວຸ້ນມ້ຽນໄວ້ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.

#### ອາການທີ່ສະແດງເຖິງໂຣຄ WNV ມີຫຍັງແດ່?

ໂຣຄ WNV ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດກາງ. ມີອາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

- ອາການທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຄົນຈໍານວນນ້ອຍ. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ WNV ປະມານ 1 ຄົນໃນ 150 ຈະປ່ວຍໜັກທີ່ສຸດ. ອາການອັນຮ້າຍແຮງອາດຮວມເຖິງ ໄຂ້ສູງ ເຈັບຫົວ ຄໍແຂງ ມືນ ງົງ ໝົດສະຕິ ສິ້ນໄຫວ ຊັກ ກ່ອນຊິ້ນອ່ອນແອ ສາຍຕາສູນຫາຍ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະອໍາມະພາດ. ອາການໝູ່ນີ້ອາດເປັນເວລານານຫລາຍສັບປະດາ ແລະອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຢ່າງຖາວອນໄດ້.
- ອາການທີ່ອ່ອນກວ່າໃນບາງຄົນ. ຄົນຈໍານວນຫລາຍເທິງ 20 ໃນຮ້ອຍໃນກຸ່ມທີ່ຕິດເຊື້ອຈະສະແດງອອກອາການຕ່າງໆ ເຊິ່ງອາດຮວມເຖິງໄຂ້ ເຈັບຫົວແລະປວດຕາມຮ່າງກາຍ ຄືນໄສ້ ຮາກ ແລະລາງເທື່ອ ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫລືອງໄຄ ຫລືຕຸ່ມຄັນຕາມຜິວໜັງເທິງໜ້າອີກ ທ້ອງ ແລະຫລັງ. ອາການໝູ່ນີ້ອາດຈະປາກົດອອກມາເປັນລະບະນານພຽງບໍ່ຈັກ

[date]

## ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ (ຕໍ່ຈາກໜ້າກ່ອນ)

ມີເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແມ່ແຕ່ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີລາງຄົນເຄີຍເປັນໄວ້ໄດ້ປ່ວຍເປັນເວລາງານຫລາຍສັບປະດາກໍຕາມ.

- ບໍ່ມີອາການປາກົດອອກມາໃນຄົນສ່ວນຫລາຍ. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ WNV ປະມານ 80 ໃນຮ້ອຍ (ປະມານ 4 ລາຍໃນ 5) ຈະບໍ່ສະແດງອາການໃດໆເລີຍ.

### ໄວລັດໄນລຕະເວັນຕົກມີການແຜ່ຫລາຍຢ່າງໃດແດ່?

- ຕົວຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອ. ໃນກໍລະນີສ່ວນຫລາຍ ເຊື້ອ WNV ຈະແຜ່ຫລາຍຍ້ອນຖືກກັດ ໂດຍຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ. ຕົວຍຸງຈະເປັນຕົວນຳເຊື້ອ WNV ຍ້ອນວ່າໂຕເອງໄດ້ຕິດເຊື້ອເມື່ອໄດ້ໃຊ້ຕົວນຳກິດເຊື້ອມາເປັນອາຫານ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຍຸງທີ່ຕິດ ເຊື້ອແລ້ວກໍສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອ WNV ໃຫ້ແກ່ມະນຸດແລະສັດອື່ນໆ ໄດ້ດ້ວຍການກັດ.
- ການໃຫ້ເລືອດ ການປ່ຽນອະວັຍຍະວະ ແລະການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງແມ່ກັບລູກ. ໃນກໍລະນີຈຳນວນນ້ອຍຫລາຍກໍໄດ້ມີການແຜ່ເຊື້ອ WNV ຜ່ານການໃຫ້ເລືອດ ການປ່ຽນອະວັຍຍະວະ ການໃຫ້ນົມລູກ ແລະການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງແມ່ກັບລູກໃນລະຫວ່າງການຖືພາ.
- ບໍ່ມີການແຜ່ຫລາຍເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການສັ່ນຜັດກັນ. ບໍ່ມີການແຜ່ເຊື້ອ WNV ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການສັ່ນຜັດໂດຍບັງເອີນເຊັ່ນການຈັບຕ້ອງຫລືຈູບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ.

### ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວຈະເລີ່ມເປັນ ໂຣດ ໂດຍໄວປານໃດ?

ຕາມປົກກະຕິ ຜູ້ຄົນຈະເລີ່ມສະແດງອອກອາການຂອງ ໂຣດລະຫວ່າງ 3 ກັບ 14 ວັນຫລັງຈາກໄດ້ຖືກກັດ ໂດຍຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ.

### ການຮັກສາການຕິດເຊື້ອ WNV ຈະໃຊ້ວິທີໃດແດ່?

ບໍ່ມີວິທີການຮັກສາທີ່ເຈາະຈົງແມ່ນອນໄວ້ສຳຫລັບການຕິດເຊື້ອ WNV . ໃນກໍລະນີຕ່າງໆ ທີ່ອາການບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ ຜູ້ຄົນຈະມີອາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໄຂ້ແລະການເຈັບປວດທີ່ຫາຍເອງໃນທີ່ສຸດ. ໃນກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ຕາມປົກກະຕິຄົນໄຂ້ຈະຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາປະເພດສນັບສນຸນ ຮວມທັງການສິດຢາເອົາເສັ້ນເລືອດ ການຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະການຮັກສາພະຍາບານ.

### ຂ້ອຍຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ ໃນກໍລະນີທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍກຳລັງຕິດເຊື້ອ WNV ?

ການເປັນໂຣດ WNV ຢ່າງບໍ່ຮ້າຍແຮງມັກຈະຫາຍເອງ ແລະຕາມປົກກະຕິ ຄົນໄຂ້ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຫາໝໍກໍໄດ້ຍ້ອນການຕິດເຊື້ອເຊັ່ນນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕັດສິນໃຈເຮັດເຊັ່ນນີ້ກໍໄດ້. ຖ້າທ່ານເລີ່ມມີອາການຂອງ WNV ທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນອາການເຈັບຫົວຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລືການສັບສົນຜິດຫມໍ້ມະດາ ຈົ່ງໄປຫາທ່ານໝໍໂດຍທັນທີໂລດ. ຕາມປົກກະຕິ ການເປັນໂຣດ WNV ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈະເປັນເຫັດໃຫ້ຈຳຕ້ອງໄປນອນໂຮງໝໍ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ຍິງຖືພາແລະຍິງລ້ຽງນົມລູກເຂົ້າປົກສາທ່ານໝໍໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການທີ່ອາດຈະເປັນໂຣດ WNV ໄດ້.

# ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ (ຕໍ່ຈາກໜ້າກ່ອນ)

## ມີການສ່ຽງຕໍ່ໂຮຄ WNV ຫລາຍ ນ້ອຍປານໃດ?

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີ ມີການສ່ຽງຕໍ່ໂຮຄທີ່ສູງກວ່າ. ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 50 ປີມີໂອກາດທີ່ສູງກວ່າໃນການມີອາການຮ້າຍແຮງຂອງການຕິດເຊື້ອ WNV ໃນກໍລະນີທີ່ຈະເປັນໂຮຄໄດ້ປ່ວຍຈິງໆ ແລະຄວນລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພື່ອຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ. ການຢູ່ນອກອາຄານ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງສ່ຽງພ້ອມຢູ່. ຍິ່ງທ່ານໄດ້ຢູ່ນອກອາຄານເປັນເວລາປານປານໃດ ຍິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ທ່ານອາດຖືກກັດໂດຍຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອ. ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ຍຸງເຂົ້າມາກັດໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຢູ່ນອກອາຄານເປັນເວລາປານ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກຫລືຫລິ້ນມ່ວນຊື່ນກໍຕາມ.

ການສ່ຽງພ້ອມເນື່ອງຈາກກະບວນການທາງແຜດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າຫລາຍ. ຈະມີການກວດເລືອດທີ່ບໍ່ລົຈາກເພື່ອຊາບວ່າມີເຊື້ອ WNV ຫລືບໍ່ກ່ອນນຳໄປໃຊ້. ການສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ WNV ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ເລືອດແລະການປ່ຽນອະວັຍຍະວະກໍນ້ອຍ ຫລາຍຈິ່ງບໍ່ຄວນເປັນຂໍ້ບັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ. ຫາກທ່ານມີຂໍ້ອ້ອງໃຈໃດໆ ໃຫ້ປຶກສາທ່ານໝໍ.

ການຖືພາແລະໃຫ້ມັນລູກບໍ່ເປັນຜົນໃຫ້ພາວະການສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ WNV ສູງຂຶ້ນ. ພາວະການສ່ຽງທີ່ WNV ອາດກໍໃຫ້ເກີດກັບລູກໃນທ້ອງແມ່ຫລືເດັກອ່ອນດ້ວຍການຕິດເຊື້ອ ໂດຍຜ່ານມັນຈາກເຕົ້າຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ. ໃຫ້ປຶກສາຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຮັກສາພະຍາບານແກ່ທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຂໍ້ອ້ອງໃຈໃດໆ.

## ໂອງການ CDC ກຳລັງດຳເນີນການໃດໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ WNV ແດ່?

ໂອງການ CDC ກຳລັງຄວມມີເຮັດການນຳກົມສາທາລະນະລສຸກທັງໃນລະດັບມົນລັຖແລະທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການອາຫານແລະຢາ [Food and Drug Administration] ແລະໜ່ວຍງານອື່ນໆ ຂອງລັດຖບານ ຄວມທັງອົງການອຸດສາຫະກັນເອກະຊົນ ເພື່ອກຽມຕົວຮັບມືແລະປ້ອງກັນການເປັນໂຮຄ WNV ລາຍໃໝ່.

ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ອົງການ CDC ກຳລັງເຮັດຢູ່ຄວມເຖິງ:

- ການປະສານງານຖານຂໍ້ມູນອີເລັກທໍນິກທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີນຮຸ້ນທັງຫລາຍແບ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ WNV ລະຫວ່າງກັນ.
- ຊ່ວຍມີນຮຸ້ນທັງຫລາຍໃນການພັທນາໂຄງການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມຍຸງທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນແລະດຳເນີນການຕາມໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
- ການພັທນາວິທີກວດສອບແລະວິນິສັຍໂຮຄ WNV ທີ່ທັງດີຂຶ້ນແລະໃຫ້ຜົນໄວຂຶ້ນ.
- ສ້າງເຄື່ອງມືແລະໂຄງການໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາໄວ້ສຳຫລັບສົມວນຊົນ ສາທາລະນະຊົນ ແລະຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງການແພດ.
- ເປີດທ້ອງປະຕິບັດການບ່ອນໃໝ່ ເພື່ອກວດສອບໂຮຄ WNV .

## ຂ້ອຍຄວນຮູ້ສິ່ງໃດອີກແດ່?

ຫາກທ່ານຜິບຊາກນິກຕາຍ: ຫ້າມຈັບຕ້ອງຊາກນັ້ນດ້ວຍມືເປົ່າ. ຕິດຕໍ່ກັບສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຊາບວິທີແຈ້ງການຕາຍແລະຂະຈັດຖິ້ມຊາກຕາຍ.

ຖ້າຕ້ອງການຊາບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ໄປທີ່ເວບໄຊຕ໌ [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov) ຫລືໂທຫາສາຍດ່ວນ CDC ທີ່ (888) 246-2675 (ພາສາອັງກິດ), (888) 246-2857 (ພາສາສະເປນ), ຫລື(866) 874-2646 (TTY)