

# Hepatitis C Can Be Prevented!



**Don't Get Stuck  
With Hepatitis C®**

Texas Department of State  
Health Services

## HEPATITIS C

- is a serious disease of the liver
- is found in blood and can be spread by:
  - sharing drug needles
  - sexual contact
  - sharing razors, toothbrushes, nail clippers, nail scissors, or any other personal article containing blood from an infected person
  - contaminated tattoo/body piercing tools
  - a mother to her newborn
- is commonly spread among people who "shoot up" drugs
- often remains in the blood of an infected person for many years and can cause cancer, cirrhosis, and even death
- is not spread through food, water, breastfeeding, sneezing, coughing, hugging, or other casual contact
- is not found in sweat, tears, or urine
- There is no vaccine to prevent hepatitis C.
- Get your blood tested if you:
  - share needles used to "shoot up" drugs
  - have signs and symptoms of liver disease
  - received a blood transfusion or organ transplant before 1992
  - received blood products before 1987
  - received hemodialysis
  - work at a job where you have exposure to blood
  - are a child born to a hepatitis C-infected mother

## SIGNS & SYMPTOMS

- fatigue
  - mild fever
  - flu-like illness
  - nausea and vomiting
  - stomachache
  - loss of appetite
- Some people have:
- no symptoms at all
  - yellow eyes and skin (jaundice)
  - dark urine
  - light-colored stool

## TREATMENT

- consult with your doctor
  - get plenty of rest
  - eat low-fat foods
  - drink plenty of liquids
  - do not drink beer, wine, or liquor
  - do not use illegal drugs (street drugs)
- Antibiotics do not help because hepatitis C is caused by a virus. Symptoms of the hepatitis C virus often go away by themselves, but the virus remains in your blood. Antiviral therapy may help.
- Hepatitis C causes chronic infection in 75%-85% of infected adults.
- If you have hepatitis C, get vaccinated against hepatitis A and hepatitis B.

## PREVENTION

- Never share needles of any kind, such as drug needles or tattoo needles.
- Limit your sex partners to one or always use a condom.
- Wear disposable gloves if you provide first aid or handle blood.
- If you have hepatitis C:
  - do not donate blood, plasma, tissue, semen, or body organs
  - do not share toothbrushes, razors, nail clippers, nail scissors, or other items that could become contaminated with blood
  - cover open sores or other breaks in your skin
  - wear gloves if handling household chemicals or cleaners
  - consult your doctor before taking any medicines
  - ask your doctor about treatment

**For information:**  
1-866-4HEPABC or  
[www.dshs.state.tx.us/idcu](http://www.dshs.state.tx.us/idcu)

**For videos, contact:**  
[www.dshs.state.tx.us/avlib](http://www.dshs.state.tx.us/avlib)

Copyright free.  
Permission granted to make copies as needed.



# ¡La Hepatitis C Puede Ser Prevenida!



**¡Hágase La Prueba!**

Texas Department of State Health Services

## LA HEPATITIS C

- es una grave enfermedad del hígado
- se encuentra en la sangre y se puede transmitir por medio:
  - de compartir agujas para drogas
  - del contacto sexual
  - de compartir navajas de rasurar, cepillos de dientes, cortauñas u otro artículo personal que tenga sangre de una persona infectada
  - de agujas o instrumentos de tatuaje o de perforación de la piel contaminados
  - de la madre a su recién nacido
- comúnmente se transmite entre la gente que se inyecta drogas
- frecuentemente se queda en la sangre de la persona infectada por muchos años y puede causar cáncer, cirrosis y hasta la muerte
- no se transmite por medio de los alimentos, del agua, al dar el pecho, al estornudar, al toser, el abrazarse o cualquier contacto casual
- no se encuentra en el sudor, las lágrimas o la orina
- No hay ninguna vacuna contra la hepatitis C.
- Vaya a que le hagan una prueba de sangre si:
  - comparte las agujas para inyectarse drogas
  - tiene síntomas de la enfermedad del hígado
  - recibió una transfusión de sangre o algún órgano antes del 1992
  - recibió productos de sangre antes del 1987

- recibió hemodiálisis
- trabaja donde usted está expuesto a la sangre
- nació de una madre infectada por la hepatitis C

## SIGNOS Y SÍNTOMAS

- fatiga
  - fiebre moderada
  - enfermedad parecida a la gripe
  - náusea y vómito
  - dolor de estómago
  - pérdida de apetito
- Alguna gente:
- no tiene ningún síntoma
  - tiene los ojos o piel amarillosa (ictericia)
  - tiene orina oscura
  - tiene heces fecales de un color claro

## TRATAMIENTO

- consulte con su doctor
  - descanse
  - coma alimentos bajos en grasa
  - tome bastantes líquidos
  - no tome cerveza, vino o licores
  - no use drogas ilícitas (de la calle)
- Los antibióticos no ayudan porque la hepatitis C es causada por un virus. Los síntomas de la hepatitis C frecuentemente desaparecen por si mismos, pero el virus se queda en la sangre. Terapia antivírica le puede ayudar.

- La hepatitis C causa infección crónica en el 75-85 por ciento de los adultos infectados.
- Si usted tiene hepatitis C, vaya a que lo vacunen contra la hepatitis A y la hepatitis B.

## PREVENCIÓN

- Nunca comparta agujas de ningún tipo, como agujas para inyectarse drogas o agujas de tatuaje.
- Tenga solamente una pareja sexual o siempre use un condón.
- Use guantes desechables si proporciona primeros auxilios o si maneja sangre o fluidos corporales.
- Si usted tiene hepatitis C:
  - no done sangre, plasma, tejido, semen o ningún órgano de su cuerpo
  - no preste sus cepillos de dientes, rasuradoras, cortauñas o ningún otro artículo contaminado con sangre
  - tápese todas las heridas abiertas en la piel
  - use guantes cuando use productos químicos y limpiadores del hogar
  - consulte a su médico antes de tomar cualquier medicina
  - pregunte a su médico sobre algún tratamiento

**Para información:**  
1-866-4HEPABC  
[www.dshs.state.tx.us/idcu](http://www.dshs.state.tx.us/idcu)

**Préstamo de videos:**  
[www.dshs.state.tx.us/avlib](http://www.dshs.state.tx.us/avlib)

No hay derechos reservados.  
Puede hacer copias.

