

Is it just a cough?



Or is it pertussis (whooping cough)?



SYMPTOMS OF PERTUSSIS: difficulty breathing and/or coughing followed by vomiting or whooping sound

VACCINATE YOUR BABY AGAINST PERTUSSIS AT 2, 4, 6 AND 15-18 MONTHS with an additional shot at four to six years old. Ask your baby's doctor if your baby can receive the 4th dose of DTaP at 12 months if it has been 6 months since the 3rd dose of DTaP. Keep your baby away from people who are coughing. See your family doctor if you think your baby or someone else in your family might have pertussis. For more information call toll free (800) 252-9152.

¿Es sólo una tos?



¿O es la tos ferina (pertusis)?



SÍNTOMAS DE LA TOS FERINA:
Dificultades para respirar, tos persistente seguida por vómitos o un silbido al respirar.

VACUNE A SU BEBÉ CONTRA LA TOS FERINA A LOS 2, 4, 6 Y 15 - 18 MESES con una vacunación adicional entre cuatro y seis años de edad. Pregúntele a su médico si su niño puede recibir la cuarta dosis del DTaP a los 12 meses de edad si han transcurrido 6 meses desde la tercera dosis del DTaP. Mantenga a su bebé alejado de personas que están tosiendo. Consulte con su médico si su bebé o algún familiar puede tener la tos ferina. Para obtener más información, llame sin costo alguno al (800) 252-9152.