

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE

ຢາສັກປ້ອງກັນ ໂຮກ ປອດອັກເສບ ແລະວັນນະໂຮກ

ສິ່ງ ທີ່ ທ່ານ ຄວນ ຮູ້

1 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສັກຢາກັນໂຮກ ?

ໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄຄອນ ເປັນເຊື້ອໂຮກທີ່ອັນຕະຣາຍ ຊະນິດ ນຶ່ງຊຶ່ງທຳໃຫ້ຄົນເກີດປ່ວຍໄຂ້ແຮງ ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ໄດ້. ຕາມສະຖິຕິໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ເຊື້ອໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄ ຄອນ Pneumococcal ນີ້ທຳລາຍຊີວິດຄົນ ຢູ່ໃນ ສະຫາຣັຖອະເມຣິກາໃນແຕ່ລະປີເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ ກວ່າເຊື້ອໂຮກອື່ນໆທີ່ຄິດລວມກັນໝົດ. ທຸກຄົນ ກໍສາມາດ ທີ່ຈະຕິດໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄຄອນ Pneumococcal ນີ້ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຍັງມີຄົນບາງຈຳພວກທີ່ສາມາດຈະ ຕິດ ໂຮກນີ້ໄດ້ງ່າຍ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີຄື ພວກຜູ້ເຖົ້າ ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ, ພວກເດັກນ້ອຍ, ແລະພວກທີ່ມີ ບັນຫາ ທາງ ດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນ ເປັນໂຮກຕິດເຫຼົ້າ, ໂຮກ ຫົວໃຈ, ໂຮກປອດ, ໂຮກໝາກໂຂ່ຫຼັງ, ໂຮກເປົາ ຫວານ, ກາມມະໂຮກຕິດຕໍ່ HIV ຫຼື ໂຮກມະເລັງ ຊະນິດຕ່າງໆ.

ໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄຄອນ Pneumococcal ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ອາການອັກ ເສບ ທາງປອດໄດ້ ຄືໂຮກປອດບວມ, ມີພຍາດ ໃນເລືອດ, ອາການ ອັກເສບ ຂອງສະໝອງ. ປະມານ 1 ໃນ 20 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ຕິດ ຈາກໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄຄອນ ນີ້. ປະມານ 2 ໃນ 10 ຄົນ ເກີດເປັນ ພຍາດໃນເລືອດ, ແລະ 3 ໃນ 10 ທີ່ເກີດເປັນໂຮກອັກເສບທາງສມອງ ຄົນຜູ້ທີ່ ມີບັນ ຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງ ເທິງນີ້ ຖ້າຫາກ ຕິດໂຮກນີ້ແລ້ວ ກໍມັກຈະເສຍຊີວິດໄປ.

ຢາຟິນິຊິລິນ Penicillin ເປັນຢາທີ່ມັກໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນການ ປິ່ນປົວຮັກສາໂຮກນີ້. ແຕ່ພຍາດນີ້ກໍຊິນເຄີຍແລະ ຕ້ານທານ ຕໍ່ຢານີ້ມາສເມີ ແລະມັນກໍແຮງທຳໃຫ້ການປິ່ນປົວ ຮັກສາ ໂຮກນີ້ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາ ປ້ອງກັນ ກໍຍິ່ງເປັນການສຳຄັນທີ່ສຸດ.

2 ຢາສັກສຳຮັບ ໂຮກ pneumococcal polysaccharide (PPV)

ສາມາດສັກປ້ອງກັນເຊື້ອໂຮກທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໂຮກ ຟິນິວໂມໂຄ ຄອນໄດ້ 23 ຊະນິດ. ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ເມື່ອສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກ ແລ້ວມັນກໍສາມາດປ້ອງກັນໂຮກ ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກືອບໝົດ ພາຍໃນ 2-3 ອາທິດທີ່ສັກຢາ ກັນໂຮກນີ້. ພວກຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ແລະຜູ້ທີ່ມີໂຮກຊຳເຮື້ອທັງຫຼາຍ ອາດຈະສັກບໍ່ໄດ້ຜົນດີເທົ່າ ທີ່ຄວນ ຫຼື ອາດບໍ່ໄດ້ຜົນເລີຍ.

3 ໃຜຄວນທີ່ຈະສັກຢາກັນໂຮກນີ້ ?

- ພວກຜູ້ເຖົ້າທັງຫຼາຍທີ່ມີ ອາຍຸ 65 ປີ ຫຼື ແກ່ກວ່ານັ້ນ
- ທຸກຄົນທີ່ອາຍຸ ສູງກວ່າ 2 ປີ ທີ່ເປັນໂຮກຊໍາເຮື້ອມາດິນຄີ:
 - ໂຮກຫົວໃຈ
 - ໂຮກປອດ
 - ພຍາດໃນເລືອດ
 - ໂຮກເປົາຫວານ
 - ໂຮກຕິດເຫຼົ້າ
 - ໂຮກຕັບແຂງ
 - ໂຮກນ້ຳມັນກະດູກແລະສມອງເຊື່ອມ
- ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ ສູງກວ່າ 2 ປີ ທີ່ມີພຍາດຕ່າງໆ ຫຼືມີສຸຂະພາບ ບໍ່ສົມບູນທີ່ມີພູມຕ້ານທານພຍາດຕ່ໍາທີ່ຈະເກີດຕິດເຊື້ອໂຮກໂຕງ່າຍເຊັ່ນ:
 - ໂຮກຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງອັກເສບຊໍາເຮື້ອ
 - ໂຮກກະດູກອ່ອນ, ໂຮກກະດູກພ່ອຍ
 - ໂຮກໝາກໂຂ່ບໍ່ທໍາງານ
 - ເນື້ອງອກທີ່ມີເຊລລ໌ທີ່ໂດຍປົກກະຕິໃນໂຂ່ກະດູກ
 - ກ່ຽວກັບໂຮກໝາກໂຂ່ຫຼັງອັກເສບ
 - ປ່ຽນໝາກອະວັຍະວະ
 - ກາມມະໂຮກຕິດຕໍ່ ຫຼື ມີເຊື້ອໂຮກແອັສ AIDS
 - ມ້າມບໍ່ທໍາງານ ຫຼື ບໍ່ມີມ້າມ
- ທຸກຄົນທີ່ອາຍຸ ສູງກວ່າ 2 ປີ ຜູ້ທີ່ພວມກໍາລັງໃຊ້ຢາຕ່າງໆ ຫຼືພວມໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍມີພູມ ຕ້ານທານພຍາດຕ່ໍາເຊັ່ນ:
 - ເຄີຍໃຊ້ຢາ ສເຕີຣອຍ ມາດິນນານ
 - ໃຊ້ຢາປິ່ນປົວໂຮກມະເລັງບາງຊະນິດ
 - ໃຊ້ແສງຫຼື ສານຮັງສີ ສໍາຮັບປິ່ນປົວ
- ສໍາຮັບຄົນ ເຊື້ອຊາດ ອາລາສກັນ, ພວກເຊື້ອຊາດ ອາເມຣິກັນ ບາງ ຈໍາພວກ.

4 ຈະສັກຢາກັນໂຮກນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ?

- ຕາມປົກກະຕິ ຄວນຈະສັກຢາກັນໂຮກນີ້ຊຸດນຶ່ງເທົ່ານັ້ນກໍພໍ.
- ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສັກຕື່ມ ທ່ານ ກໍອາດຈະສັກອີກເປັນຊຸດທີ່ສອງ.
- ສັກຢາກັນໂຮກຊຸດທີ່ສອງນີ້ ສວ່ນຫຼາຍມັກຈະແມ່ນພວກຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຫຼື ແກ່ກວ່ານັ້ນ. ຜູ້ທີ່ເຄີຍສັກເທື່ອ ທໍາອິດ ເມື່ອລາວອາຍຸຍັງຕໍ່າກວ່າ 65 ປີ. ຖ້າຫາກວ່າລາວ ເຄີຍສັກມາແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ 5 ປີ ຫຼັງ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ.
 - ສັກຢາ ກັນໂຮກ ອີກຄົນເທື່ອທີ່ສອງ ແມ່ນສັກໃຫ້ສໍາຮັບ ແຕ່ຄົນຜູ້ທີ່:
 - ມ້າມບໍ່ທໍາງານ ຫຼື ບໍ່ມີມ້າມ
 - ມີພຍາດໃນເລືອດ
 - ມີກາມມະໂຮກຕິດຕໍ່ ຫຼື ໂຮກ ແອັສ AIDS
 - ເປັນໂຮກມະເລັງ, ໂຮກກະດູກພ່ອຍ, ໂຮກກະດູກອ່ອນ, ໂຮກໝາກໂຂ່ຫຼັງ
 - ໝາກໂຂ່ຫຼັງບໍ່ທໍາງານ
 - ເນື້ອງອກທີ່ມີເຊລລ໌ທີ່ໂດຍປົກກະຕິໃນໂຂ່ກະດູກ
 - ເຄີຍປ່ຽນອະວັຍະວະຕ່າງໆ ຫຼື ເຄີຍ ປ່ຽນຕໍ່າກະດູກ
 - ພວມກໍາລັງໃຊ້ຢາທີ່ຊ່ອຍຕ້ານທານພູມຕ້ານທານຕໍ່ ພຍາດ ຕ່ໍາ (ການໃຊ້ສານເຄມີ ຮັກສາໂຮກ, ຫຼື ໃຊ້ຢາ ສເຕີຣອຍ ມາດິນນານ)
- ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຫຼື ອ່ອນກວ່ານັ້ນ ອາດຈະສັກຢາກັນໂຮກຊຸດທີ ສອງ ໃນ 3 ປີ ຫຼັງຈາກ ສັກຢາເທື່ອທໍາອິດ. ສໍາຮັບຜູ້ທີ່ອາຍຸ ສູງກວ່າ 10 ປີ ຄວນຈະສັກຢາກັນໂຮກນີ້ ໃນ 5 ຫຼັງຈາກສັກຢາເທື່ອທໍາອິດ

5 **ຄວາມສໍາຄັນ
ໃນການສັກຢາກັນໂຮກນີ້ ?**

- ເດັກນ້ອຍທີ່ສຸຂພາບສົມບູນ ແຕ່ມັກຈະເປັນເຈັບຫູ, ຕັນດັງ, ຫຼື ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈຕ່າງໆ ນັ້ນບໍ່ຈໍາ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາ PPV. ເພາະເນື່ອງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.
- ຢາ PPV ນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນດີກັບບາງຄົນ. ພິເສດສຸດ ສໍາຮັບຜູ້ທີ່ພູມຕ້ານທານຕໍ່ພຍາດຕໍ່າ. ແຕ່ວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຄວນຈະສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້ເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕິດ ໂຮກ Pneumococcal ໄດ້ງ່າຍ ແລະເກີດ ປວ່ຍໄຂ້ ແຮງທີ່ສຸດ.
- ສໍາຮັບຜູ້ຖືພາ: ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ຖື ພານັ້ນຈະມີຄວາມປອດພ້ຍພຽງໃດເມື່ອສັກຢານີ້. ແລະກໍ ຍັງບໍ່ທັນມີການຮາຍງານໃຫ້ເຫັນວ່າຢານີ້ເປັນອັນ ຕະຮາຍຢ່າງໃດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືພາ ຫຼື ຕໍ່ເດັກທາຣົກໃນທ້ອງ, ຫຼືບໍ່ມີການສົ່ງທຳມປາມຢ່າງໃດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງ ຖືພາສັກຢານີ້. ຜູ້ຍິງຊຶ່ງອາດ ຈະມີໂອກາດຕິດຈາກເຊ ື້ອໂຮກນີ້ໄດ້ງ່າຍ ຄວນຈະສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄວ້ ກ່ອນທີ່ລາວຈະຖືພາ. ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້.

6 **ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກ ການສັກຢາ
ກັນໂຮກນີ້ມີຫຍັງແດ່ ?**

ຢາ PPV ເປັນຢາທີ່ປອດພ້ຍດີ.

ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈໍານວນຄົນທີ່ສັກຢານີ້ ອາດເກີດມີປະຕິກິຣິຍາ ເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ ເກີດເປັນປ່ານແດງ, ເຈັບທີ່ບໍ່ຮິເວນ ຖືກ ສັກຢານີ້.

ນ້ອຍ ກວ່າ 1% ຂອງຜູ້ທີ່ສັກຢານີ້ ເກີດເປັນໄຂ້, ເຈັບຕາມ ກ້າມເນື້ອ, ຫຼືເກີດມີອາການຕ່າງໆ. ການເກີດອາການ ແພ້ຕ່າງໆຮ້າຍແຮງນັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍຈະເຫັນມີຫຼາຍເທົ່າໃດ

ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍເກີດມີອາການແພ້ທີ່ຮ້າຍແຮ

ການໃຊ້ຢານີ້ປົນກັນກັບຢາຊະນິດອື່ນໆ, ອາດຈະເປັນການ ສ່ຽງ ທີ່ຈະ ນໍາໄປເຖິງການເກີດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ອາດຈະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢານີ້.

ຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດພຍາດນັ້ນ ຮ້າຍແຮງກວ່າຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຕິກິຣິຍາຂອງຢາທີ່ ສັກປ້ອງກັນ.

7 **ຈະເປັນຢ່າງໃດ ຖ້າມີປະຕິກິຣິຍາ
ທີ່ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ?**

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະສັງເກດຈາກອັນໃດ?

- ເກີດອາການແພ້ຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງ (ລົມຜິດ, ຫາຍໃຈ ຍາກ, ສະລົບ)

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງໃດ?

- ໂທຣສັບໄປຫາທ່ານໝໍ ຫຼື ເຂົ້າໄປພົບທ່ານໝໍ ທັນທີທັນໃດ
- ບອກເຫຼົ່າເຖິງສາຍເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທ່ານໝໍຝັງ, ວັນ ແລະເວລາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ວັນເວລາທີ່ທ່ານ ສັກຢາ ກັນໂຮກນັ້ນ.
- ຖາມນໍາທ່ານໝໍ, ນາງພຍາບາລ, ຫຼື ກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກ ເຖິງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ຈະປະກອບ ເພື່ອຈະ ໄດ້ຮັບ ການສັກຢາ ນີ້ ຊຶ່ງຮຽກວ່າ Vaccine Adverse Event Reporting Systems (VAERS), ຫຼື ທ່ານ ຈະໂທຣສັບໄປທີ່ VAERS ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ເບີໂທຣ 1-800-822-7967.

8

ຂ້າພະເຈົ້າຈະສຶກສາ ຄັນຄວ້າ
ໄດ້ຢ່າງໃດ ?

- ຖາມນຳທ່ານໝໍ, ຫຼື ນາງພຍາບາລ. ຖ້າຫາກວ່າ
ເຂົາເຈົ້າພໍຈະໃຫ້ເອກກະສານຫຼືປຶ້ມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ສັກຢາມີໄດ້ແກ່ທ່ານ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ໄປ
ຊອກຫາ ເອົາຈາກບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ.
- ໂທຣສັບໄປຫາ ສຳນັກງານ ສາທາຣະນະສຸກ
ປະຈຳເຂດຄຸ້ມບ້ານທ່ານ ຫຼື ປະຈຳຣັຖຂອງທ່ານ.
- ຕິດຕໍ່ໄປຍັງ ສຳນັກງານ ສູນກາງຄວບຄຸມ
ແລະປ້ອງກັນໂຣກຕ່າງໆ (Centers for Disease
Control and Prevention (CDC):

Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)

ຫຼື

ຕິດຕໍ່ທາງຂ່າວສານຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີແມ່ນ
CDC website
<http://www.cdc.gov.nip>

