

ការណែនាំរបៀបរៀបចំខ្លួន ដើម្បីធ្វើតេស្ត
COLONOSCOPY ដោយប្រើថ្នាំថ្លង់ Golytely

ថ្ងៃណាត់ជួប : _____
 ម៉ោងណាត់ជួប : _____
 ទីកន្លែង : _____

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៧ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :

- រកអ្នកជូនដំណើរ : គ្រូពេទ្យនឹងដាក់ថ្នាំឱ្យលោកអ្នកសំរាក និងសម្លឹង ដូច្នោះអ្នកមិនអាចបើកឡាន ឬជិះឡានសាធារណៈទៅផ្ទះបានទេ ។ បើអ្នកមកមន្ទីរពិនិត្យដោយគ្មានអ្នកជូនទេ នោះ ការពិនិត្យរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវធ្វើការណាត់សាជាថ្មី ។
- ឈប់លេបថ្នាំជំនួយជាតិដែក (Iron) រឺ វីតាមីន E #gingo# ខ្លី ថ្នាំអាស្តារីន និងខ្លឹមស ។
- បើអ្នកលេបថ្នាំ Coumadin ឬបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នកសំរាប់ការណែនាំពិសេស ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ១ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល:

- ចាប់ផ្តើមគំរោងទទួលទានតែអាហាររាវថ្លា ។ បើអ្នកដាក់វត្ថុរាវក្នុងកែវថ្នាំមួយ ហើយអ្នកអាចមើលឃើញផ្ទះ នោះអ្នកអាចទទួលទានបាន ។ អាហាររាវថ្លាមានដូចជា :
 - ទឹកប៉ោម ទឹកទំពាំងបាយជូស និងទឹក cranberry
 - ស៊ុបមាត់ និងស៊ុបគោដែលថ្លា
 - តែ និងកាហ្វេដោយមិនមានលាយទឹកដោះគោ ឬ ក្រែម
 - ទឹកស្អាត #Gatorade Kool-Aid និងសារាយ Jell .o# មានរសជាតិផ្សេងៗ (ពណ៌អ្វីក៏បានលើកលែងតែពណ៌ក្រហម)
- រៀសវាង : ទឹកខាប់ៗ ទឹកដោះគោ ក្រែម និងអាហាររឹង ។
- ចាក់ទឹកឱ្យពេញចូលក្នុងកំប៉ុងឆ្នាំស្តិកដែលមានម្សៅថ្នាំបញ្ចុះ (Golytely) ក្រឡកឱ្យបានសព្វរហូតដល់ម្សៅរលាយអស់ ហើយដាក់កំប៉ុងនោះនៅក្នុងទូរទឹកកក។####
- ម៉ោង 1:30 ថ្ងៃរសៀល លេបថ្នាំ Metoclopramide ១គ្រាប់ជាមួយទឹក ។ ថ្នាំនេះជួយអ្នកកុំឱ្យមូលពោះ ដែលបណ្តាលមកពីថ្នាំ Golytely ។
- ម៉ោង 2:00 ថ្ងៃរសៀល ចាប់ផ្តើមទទួលទានថ្នាំទឹកបញ្ចុះ (Golytely) ។ ទទួលទានម្តងមួយកែវពេញរាល់ ១៥នាទីរហូតទាល់តែអស់ ។ សូមប្រើប្រាស់ទទួលទានម្តងមួយកែវពេញប្រសើរជាងម្តងបន្តិច ។
- ម៉ោង 5:00 ល្ងាច លេបថ្នាំ Metoclopramide ១គ្រាប់ទី២ ជាមួយទឹក ។
- បន្តទទួលទានវត្ថុរាវពេញមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែកុំញ៉ាំអាហាររឹងឱ្យសោះ ។
- ទឹកថ្នាំបញ្ចុះ Golytely នឹងបណ្តាលឱ្យអ្នកបត់ដើងធំធ្លាក់ញាប់ ។ យើងត្រូវការបែបនេះ ដើម្បីឱ្យពោះវៀនរបស់អ្នកទំនេរស្អាតសំរាប់ការពិនិត្យ ។ បើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ចប់ការណែនាំនេះ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នក ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៣ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :

- បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ជាមួយអ្នកជូនដំណើររបស់អ្នក ។
- បើអ្នកត្រូវការលុបការណាត់ជួប សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នក ។
- ពិនិត្យឡើងវិញនូវអាហារដែលត្រូវតមសំរាប់កំឡុងពេល ២ថ្ងៃក្រោយ ចូរគំរោងអាហាររបស់អ្នកតាមវិធីខាងក្រោមនេះ ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ២ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល :

- ទទួលទានទឹកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៨កែវក្នុងមួយថ្ងៃ ។
- ឈប់លេបថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺរលាក ដូចជាថ្នាំ : Nuprin, Bufferin, Anacin, Advil, Motrin, Indocin, Voltran, Aleve, Ecotrin, Relafen, Alka Seltzer, Naprosyn, Voltaren (Tylenol អាចលេបបាន) ។
- ឈប់ញ៉ាំអាហារគ្រាប់ ពោតលើង គ្រាប់សណ្តែក និងធញ្ញជាតិផ្សេងៗ ។
- ហាមទទួលទានអាហាររឹងបន្ទាប់ពីម៉ោង ១២យប់ ។



ធ្វើរបៀបទាំងនេះ នៅថ្ងៃ ពិនិត្យ :

#

- លេបថ្នាំដែលត្រូវលេបដូចធម្មតាជាមួយនឹងទឹកបន្តិច ។
- អ្នកអាចទទួលបានអាហាររាវរហូតដល់ ៣ម៉ោងមុនពេលពិនិត្យ ។
- នាំអ្នកជូនដំណើរ ឬអ្នកបើកឡានមកមន្ទីរពិនិត្យជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃណាត់ ។
- អ្នកត្រូវមកដល់មន្ទីរពិនិត្យរោគ ៣០នាទីមុនម៉ោងណាត់ ។

តើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីការណែនាំនេះ ឬទេ ? សូមទូរស័ព្ទទៅ : _____ ។

មានការធ្វើតេស្តលើសរសៃឈាមតាមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រខុសគ្នា ហើយវាក៏ស្ទើរដោយមានការត្រៀមខ្លួនខុសគ្នាដែរមុនចាប់ ផ្តើមការធ្វើតេស្ត។ ឧទាហរណ៍
 ការធ្វើតេស្តខ្លះស្ទើរដោយមានការតមអាហារមុនពេលធ្វើតេស្ត ចំណែកឯតេស្តផ្សេងៗ ទៀតមិនចាំបាច់តមអាហារឡើយ។ សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកជាមុនសិនថា
 តើលោកអ្នកត្រូវរៀបចំ ចំនួនពូជម្តេចខ្លះសំរាប់ការធ្វើតេស្តនោះ។