

# ຢາວັກຊີນກັນພຍາດຮີໂມຟິລັສ ອິນຟລວນສີປະເພດບີ (Hib Vaccine) Haemophilus Influenzae Type b

## ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້


### 1 ພຍາດຮີໂມຟິລັສ (Hib) ແມ່ນຫຍັງ?

ພຍາດຮີໂມຟິລັສອິນຟລວນສີປະເພດບີ (ຮີໂຈເອບີ) Haemophilus influenzae (Hib). ແມ່ນພຍາດກັນດາວນເນື່ອງມາຈາກແມ່ພຍາດບັກເຕີຣີຊີວິດນຶ່ງ. ມັນມັກເຂົ້າເດັກນ້ອຍອ່ອນຫຼຸດ 5 ປີລົງມາ.

ລູກຂອງທ່ານອາດຕິດແປດພຍາດຮີໂຈເອບີ (Hib) ຍ້ອນຢູ່ໄກ້ຊິດເດັກຫຼືຄົນຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອພຍາດຊ້ອນຢູ່ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ແມ່ພຍາດຕິດແປດບຸກຄົນຫາບຸກຄົນ. ກ້າຫາກແມ່ພຍາດອາໄສຢູ່ໃນຜູ້ດັ່ງກ່າວແລະຄໍາເດັກກໍຈະບໍ່ເຈັບປ່ວງລົງດອກ. ແຕ່ບ່າງທີແມ່ພຍາດພັດລາມໄປຫາປອດຫຼືສາຍເລືອດ, ແລ້ວແມ່ພຍາດຮີໂຈເອບີ (Hib) ກໍກໍ່ເຫດຮ້າຍຂຶ້ນໄດ້.

ແຕ່ບ່າງເມື່ອຍັງບໍ່ທັນມີຢາວັກຊີນຕ້ານຮີໂຈເອບີ (Hib), ພຍາດຮີໂຈເອບີກໍແມ່ນສ່າຍເຫດໃຫ້ຂອງເອື້ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ (Meningitis) ຍ້ອນແມ່ບັກເຕີຣີຊີວິດອັນມັກເກີດແກ່ເດັກອ່ອນຫຼຸດ 5 ປີລົງມາຢູ່ໃນສະຫະຣັກ. ພຍາດຊຶ່ງແຕະຕ້ອງເອື້ອຫຸ້ມໂຄ້ນແລະກ້າວສມອງຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍອັນຍືນຍານແກ່ມັນສມອງແລະເສຍຫຼຸ. ພຍາດນີ້ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດ:

- ປອດບວມ.
  - ຜິງຄໍຕີປໂຄ່ເຮັດໃຫ້ຫັນໃຈຜິດ.
  - ແມ່ພຍາດເຂົ້າເລືອດ, ເຂົ້າຂໍ້, ເຂົ້າກະດູກແລະເອື້ອຫໍ່ໝາກຫົວໃຈ.
  - ເສຍຊີວິດ.
- ກ່ອນເພີ່ມມີຢາວັກຊີນນີ້ໃຫ້ເຮົາໃຊ້, ເດັກນ້ອຍຫຼຸດ 5 ປີຢູ່ໃນສະຫະຣັກແຕ່ລະປີປະມານ 20,000 ຄົນເປັນພຍາດ ຂນາດໝັກ (Hib) ນີ້, ແລະເກືອບເກືອ 1,000 ກໍເສຍຊີວິດ.



ຢາວັກຊີນຕ້ານຮີໂຈເອບີ (Hib) ສາມາດປ້ອງກັນເຮົາບໍ່ໃຫ້ພຍາດເຂົ້າໄດ້. ເດັກຕິດພຍາດຮີໂຈເອບີ (Hib) ຈະເພີ່ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນກ້າພວກເຮົາພາກັນຢຸດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາກັນນີ້.

### 2 ຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ຮັບຢາວັກຊີນຮີໂຈເອບີ (Hib) ແລະເມື່ອໃດ?

ເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຕ້ານພຍາດນີ້ (HIB) ເມື່ອເຂົາມີອາຍຸໄດ້:

- ✓ 2 ເດືອນ
- ✓ 4 ເດືອນ
- ✓ 6 ເດືອນ
- ✓ 12-15 ເດືອນ

\*ຕາມແຕ່ລະຊຸດຢາວັກຊີນຮີໂຈເອບີໃຊ້ ແກ່ເດັກ. ຂບາບສຳລັບອາຍຸ 6 ເດືອນອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການ. ທ່ານໝູ່ຜູ້ພຍາບາບຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຈຳເປັນຫຼືບໍ່.

ກ້າທ່ານຫາກຂ້າມກາຍຂບາບຢາວັກຊີນນີ້ຫຼືຕົກຫຼ້າຊ້າ ເວລາກໍຈົງຮັບຂບາບຕໍ່ມາໂດຍດ່ວນ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົ້ນໃໝ່.

ທ່ານຈະຮັບຢາຮີໂຈເອບີວັກຊີນນີ້ພ້ອມກັບຢາວັກຊີນຊີວິດອື່ນກໍໄດ້.

ເດັກອາຍຸແກ່ກວ່າແລະຜູ້ໃຫຍ່ ຕາມທັມມະດາແລ້ວ, ເດັກອາຍຸເກີນ 5 ປີໄປບໍ່ຕ້ອງການຢາວັກຊີນ. ແຕ່ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີພິເສດຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນເດັກເກີນ 5 ປີແລະຜູ້ໃຫຍ່ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຢານີ້, ສະພາບດັ່ງກ່າວມີຄື: ພຍາດເມັດເລືອດແດງລີບ (sickle cell disease), ເຮຈໄອວີ (HIV)/ເອດສ (AIDS), ກຶກປາດເອົາມ້າມອອກ, ກ່າຍແທນໄຂກະດູກ, ປິວໂອຄມະເຮັງ (cancer) ດ້ວຍຢາ. ຈົງກຸາມລາຍລະອຽດນຳທ່ານໝູ່ຜູ້ພຍາບາບຂອງທ່ານ.

### 3 ຄົນຈຳພວກນຶ່ງຮັບຢາວັກຊີນນີ້ບໍ່ໄດ້ຫຼືຕ້ອງໂຈະໄວ້ຊິດຄາວ

- ຜູ້ທີ່ເຄີຍແພ້ຢາວັກຊີນຮີໂຈເອບີ (Hib) ມາກ່ອນດ້ວຍອາການສາຫັດຕ້ອງຢຸດບໍ່ຮັບເອົາຂບາບຕໍ່ປອກ.
- ເດັກອາຍຸອ່ອນກວ່າ 6 ອາທິດກໍບໍ່ໃຫ້ຮັບຢານີ້.
- ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍໝັກຫຼືປາບກາງກົງກັບຊ່ວງຍາມສັກຢາວັກຊີນນີ້ກໍຕ້ອງລໍກ້າຈົນກວ່າຫາຍຂາດຈົງສັກໄດ້.

ຈົງກຸາມລາຍລະອຽດນຳທ່ານໝູ່ຜູ້ພຍາບາບຂອງທ່ານ.

**4 ອັນຕຣາຍເນື່ອງຈາກຮັບຢາວັກຊີນເຮຈະໄອບີ (Hib) ມີຫຍັງແນ່?**

ດັ່ງດຽວກັບຢາທີ່ໄປ, ຢາວັກຊີນຕ້ານພາວະກໍສາມາດກໍ່ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກໍໄດ້. ຕົວຢ່າງອາການກະທົບແພ້ທີ່ກັນດານ. ກໍຣະນີແພ້ຢາ ຂນາດໝັກຫຼືຂັ້ນເສັຽຊີວິດແມ່ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ຮັບຢາວັກຊີນ (Hib) ບໍ່ພົບກັບບັນຫາອັນໃດທັງສິ້ນ.

**ບັນຫາເບົາບາງ**

- ແດງ, ຮ້ອນ, ຫຼືໂຄ່ປ່ອນສັກຢາ (ເກີດຂຶ້ນໃນ 1 ຕໍ່ 4 ຄົນ).
- ຄິງຮ້ອນສູງກ່າວ 101°F (ເກີດຂຶ້ນໃນ 1 ຕໍ່ 20 ຄົນ)

ເມື່ອບັນຫາດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ, ມັນຈະເລີ່ມ 1 ວັນຫຼັງຈາກ ສັກຢາວັກຊີນ, ມັນຈະຫາຍ ພາຍຫຼັງ 2 ຫາ 3 ວັນ.



**5 ຈະເຮັດຫຍັງກ້າເກີດມີອາການກະທົບແພ້ຢາປານ ກາງຫຼືຂນາດໝັກ?**

**ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຫຍັງ?**

ສະພາບຜິດປົກຕົວອັນໃດອັນນຶ່ງເຊັ່ນການກະທົບແພ້ຢາ ຂນາດໝັກ, ໄຂ້ຄິງຮ້ອນສູງຫຼືຄວາມຄິດແລະການປະພຶດປ່ຽນແປງ. ໃນອາ ການແພ້ຢາຂນາດໝັກກໍ່ມີອາການທັນໃຈຜິດ, ຄໍ່ແຫບູຫຼືມີສຽງຫອດ ແຫດ, ເກີດມື້ນມ່ານຕາມຜິວໜັງ, ໜ້າຕາຈິດຈາງ, ເມືອງອ່ອນຕາມ ແຂນຂາ, ຫົວໃຈເຕັ້ນກືເຂົ້າ, ຫຼືວິນຫົວເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງສາມນາທີຫຼັງຈາກສິດຢາວັກຊີນເຂົ້າ.

**ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແນ່?**

- ຮ້ອງຫາທານໝໍ, ຫຼື ໄປຫາໝໍທັນທີ.
- ເລົ່າໃຫ້ທານໝໍຟັງສິ່ງທີ່ເປັນໄປ ວັນທີ່ແລະເວລາເຫດເກີດຂຶ້ນ, ແລະເວ ລາທີ່ໄດ້ສັກຢາ.
- ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທານໝໍຫຼືຜູ້ພະຍາບານ, ຫຼືພັນກາງານສາທາຣະນະສຸຂກຽມຟອມ ສົ່ງເຂົ້າຣະບົບລາຍງານເຫດຮ້າຍເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນ (VAERS) ຫຼື ໂທຣ. ຫາ (VAERS) ໂດຽກົງທີ່ 1-800-822-7967.

**6 ໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອທົດແທນຄ່າເສັຽຫາຍ ເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນ**

ໃນກໍຣະນີນີ້ອົງໝັກນ້ອຍໝາຍເຖິງທ່ານຫຼືລູກທ່ານລົ້ມປ່ວງລົງເນື່ອງຈາກຢາ ວັກຊີນກໍ່ມີໂຄງການສະຫະຣັກໄວ້ສໍາລັບຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວປົວຣະບັດໃຫ້.

ເພື່ອລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອທົດແທນຄ່າເສັຽຫາຍ ເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນ ຈົງໂທຣ.ໄປທີ່ 1-800-338-2382 ຫຼື ສ່ອງຊ້ຽມ ຕາມ່າງຄອມພິວເຕີ້ ທີ່ <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/>

**7 ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະຮູ້ລະອຽດຂຶ້ນຕື່ມ?**

- ກາມທ່ານໝໍຫຼືຜູ້ພະຍາບານຂອງທ່ານ. ເພິ່ນຈະເອົາເອກສານໃຫ້ໃບ ອ່ານຫຼື ແນະນໍາສາຍຂ່າວອື່ນໃຫ້ຮູ້.
- ໂທຣ.ກາມພະແນກສາທາຣະນະສຸຂ ຂອງຣັກຫຼືທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບໂຄງ ການສັກຢາກັນພາວ
- ຕິດຕໍ່ສູນກາງຄວບຄຸມແລະກັນພາວ (CDC):
  - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
  - ອ້ຽມຕາມ່າງຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອເບິ່ງໂຄງການປ້ອງກັນພາວ (National Immunization Program). ທີ່: <http://www.cdc.gov/nip>



**U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES**  
Centers for Disease Control and Prevention  
National Immunization Program