

منشآت التصنيع:

الإستراتيجيات الرئيسية للوقاية من انتشار عدوى كوفيد-19 بين الموظفين

النسخة المتاحة: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html>

ينبغي لأرباب العمل تقييم مكان العمل للتحري عن العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة خطر انتشار كوفيد-19. وضع خطة للصحة والسلامة باستخدام مزيج من توصيات الوقاية التالية. التواصل بشكل متواتر مع المسؤولين الحكوميين و/أو المحليين لشؤون الصحة العامة واختصاصيي الصحة والسلامة المهنية للاطلاع على آخر المستجدات والأمور المتعلقة بمرض كوفيد-19.



• حث المرضى من الموظفين على المكوث في المنزل (هما فيهم الموظفين الإيجابيين لفيروس كورونا لكن لا تظهر عليهم أعراض). وضع سياسات تحث المرضى من الموظفين على المكوث في المنزل دون الخوف من العقاب أو فقدان الحوافز، والتأكد من أن الموظفين على دراية بهذه السياسات. مساعدة اختصاصيي الطب المهني في وضع سياسات للعاملين الذين قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة فيما يتعلق بمرض كوفيد-19.



• إبقاء الموظفين على بعد 6 أقدام على الأقل من بعضهم البعض الإمكان. استخدام الحواجز المادية، أو خفض عدد الموظفين، أو تعديل أماكن العمل، أو إجراءات العمل، أو ساعات العمل ومناوبات العمل لزيادة المسافة بين الموظفين. إضافة المزيد من محطات تسجيل توقيت الحضور والانصراف، وأضف كراسي متباعدة في غرف الاستراحة، وأضف مظلات خارجية للاستراحات.



• تكثيف وتيرة التنظيف والتعقيم في الأماكن المشتركة. تنظيف وتعقيم الأدوات والمعدات الأخرى كلما قام الموظفون بتغيير أماكن عملهم، وذلك على أقل تقدير. تعقيم الأسطح المتكررة الاستخدام في أماكن العمل وغرف الاستراحة في نهاية كل مناوبة عمل. تنظيف وتعقيم الحافلات أو الشاحنات الصغيرة إذا تم استخدامها.

• تشجيع الموظفين على ممارسة التباعد الاجتماعي (الابتعاد عن الآخرين مسافة 6 أقدام على الأقل). تنظيم مواعيد الراحة ومناوبات العمل. وضع رسائل تذكيرية مرئية في أماكن تجمع الموظفين، بما في ذلك مناطق العمل، وأماكن الاستراحة، وغرف تبديل الملابس، والقاعات أو الممرات، والمداخل والمخارج. حث الموظفين على تجنب ركوب السيارات من وإلى العمل، إن أمكن.

• فرز الموظفين للتحري عن أعراض كوفيد-19 المحتملة قبل دخولهم بيئة العمل. التشاور مع المسؤولين الحكوميين أو المحليين لشؤون الصحة واختصاصيو الطب المهني بشأن إجراءات الفرز. تسريح الموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض إلى منازلهم على الفور، وتشجيعهم على الخضوع للعزل الذاتي في المنزل، والإبلاغ عن موعد إمكانية عودتهم إلى العمل.



• تأمين أغطية الوجه القماشية ودروع الوجه. التأكيد على ضرورة ارتداء أغطية الوجه على نحو صحيح (تغطي الأنف والشم). تأمين أغطية قابلة للغسل ومزودة بطبقات متعددة من القماش. استبدال الأغطية عندما تصبح مبللة أو متسخة أو ملوثة. تنظيف دروع الوجه بعد كل مناوبة إذا تم استخدامها. التأكيد على ضرورة امتداد دروع الوجه إلى ما بعد الذقن وتطويقها لجانبى الوجه.



• تعزيز النظافة السليمة للأيدي. إتاحة إمكانية الحصول على المياه الجارية، والصابون، والمناشف الورقية، وحاويات القمامة (حاويات القمامة التي تعمل بدون لمس، إن وجدت). حث الموظفين على غسل الأيدي لمدة 20 ثانية على الأقل. تكثيف عدد محطات تعقيم الأيدي (بدون لمس حيثما أمكن). تأمين مطهرات كحولية للأيدي بتركيز كحولي لا يقل عن 60%.

• تأمين معدات الوقاية الشخصية (PPE) المطلوبة لمهام الوظيفة. عدم استخدام أغطية الوجه كبديل لمعدات الوقاية الشخصية المطلوبة أو الموصى بها مثل أجهزة التنفس أو الأقنعة الطبية. التأكيد على ضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE) على نحو صحيح. تدريب الموظفين على كيفية ارتداء وخلع معدات الوقاية الشخصية (PPE) دون تعريض أنفسهم للتلوث.

• تدريب الموظفين وتوعيتهم بشأن كوفيد-19 وكيفية وقاية أنفسهم والآخرين في المنزل والعمل. تناول موضوعات مثل المكوث في المنزل عند الإصابة بوعكة، والتباعد الاجتماعي وكيفية ارتداء أغطية الوجه القماشية، والنظافة السليمة للأيدي. توفير مواد توعوية بأسلوب بسيط يسهل فهمه وبلغات مناسبة. يتوفر لدى مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها (CDC) [معلومات](#) متاحة للتنزيل.



• وضع خطة تشغيلية طارئة. التأهب لمواجهة ارتفاع نسبة الغياب. وضع خطة لكيفية استمرار خدمات العمل الأساسية في ظل انخفاض قوة العمل. تدريب العاملين على مهارات متعددة لأداء المهام الحرجة.

