

生产设施：

预防员工感染 COVID-19 的关键策略

可访问的版本：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html>

雇主应对其工作场所可能传播 COVID-19 的风险因素进行评估。结合以下预防建议，制定一份健康和计划。经常与州和/或当地的公共卫生官员和职业安全与健康专家联系，以获取有关新冠肺炎的相关且最新的信息。

- 尽量使员工间保持 **6 英尺** 的距离。使用实体性屏障，减少人员或调整工作场所、工作流程或时间和班次，进而增加员工间的距离。添加额外的上下班打卡站，将休息室的椅子分隔开，并在室外添加帐篷用于休息。



- 鼓励生病员工待在家里（包括测试阳性但无症状的员工）。制定政策，以鼓励患病的员工呆在家里，而不必担心受到惩罚或失去收入，确保员工了解这些政策。与职业医疗专家联手，为可能与 COVID-19 有关的风险较高的人员制定政策。



- 在共享空间中，增加清洁和消毒的频率。至少与员工更换工作场所一样频繁地清洁并消毒工具或其他设备。在每个班次结束时，消毒工作场所和休息室中经常被触碰的表面。如果使用巴士或面包车，对其清洁并消毒。



- 鼓励员工进行社交隔离（与他人保持至少 **6 英尺** 的距离）。错开休息时间及班次。在员工聚集的地方张贴提醒，其中包括工作区域、休息区域、更衣室、走廊或楼道和出入口区域。鼓励员工尽量避免上下班拼车。

- 在员工进入工作场所之前，对其进行潜在的 **COVID-19 症状筛查**。就筛查流程事宜，向州和当地卫生官员以及职业医疗专业人士进行咨询。将出现症状的员工立即送回家，鼓励其在家里进行自我隔离，并提供有关何时可以返岗的信息。

- 提倡正确的手部卫生。提供自来水、肥皂、纸巾和垃圾桶（如有，非接触式垃圾桶）。让员工洗手至少 20 秒。增加洗手液站点的数量（如可能，非接触性）。提供至少含有 60% 的酒精浓度的酒精性洗手液。



- 提供口罩和面罩。确保正确佩戴口罩（紧密遮盖口鼻）。提供具有多层织物的可洗式口罩。请在口罩潮湿、脏污、或污染时更换。在每个班次使用后，清洁面罩。确保面罩能够遮盖住下巴，并包住脸部两侧。



- 进行有关 **COVID-19 以及如何**在家里和工作中保护自己及他人的员工教育与培训。覆盖关于生病时待在家中、社交距离、佩戴口罩的方法和适当的手部卫生等主题。使用易于理解的形式和适当的语言提供材料。CDC 提供可下载的海报



- 为所需的工作任务提供个人防护装备（PPE）。不要用口罩替代建议的或要求的个人防护装备，例如呼吸器或医用口罩。确保正确使用 PPE。培训员工如何在不污染自己的前提下穿脱个人防护装备。

- 创建一份紧急运营计划。对缺勤增加做好准备。计划如何以降低的劳动力来继续业务的基本职能。交叉培训员工以履行关键性的职责。



[cdc.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus)